

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli

Wirkstoff: *Manganum sulfuricum Dil. D12*

Homöopathisches Arzneimittel zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Wenn bei den Krankheitssymptomen keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* beachten?
3. Wie ist *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* und wofür wird es angewendet?

Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli sind homöopathische Streukügelchen (Globuli) mit dem Wirkstoff *Manganum sulfuricum Dil. D12* (Schüssler-Salz Nr. 17).

Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* beachten?

Einnahme von *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder:

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren erfolgt nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

Hinweis:

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). Bitte nehmen Sie das Präparat daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* einzunehmen?

Art der Anwendung
Zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/anzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* enthält:

In 10 g *Streukügelchen* sind verarbeitet:

Wirkstoff: *Manganum sulfuricum Dil. D12* 0,1 g

Sonstiger Bestandteil: *Sucrose*

Wie *Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli* aussieht und Inhalt der Packung

Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli sind kleine runde weiße Streukügelchen.

Orthim Nr. 17 Manganum sulfuricum D12 Globuli kommt in folgenden Packungen in den Handel: Packungen zu 15 g Streukügelchen (Globuli).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Orthim GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 17-19
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. +49 (0) 52 45 / 92 010-0
Fax +49 (0) 52 45 / 92 010-66
Internet: www.orthim.de
E-Mail: info@orthim.com

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 90206.00.00

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2019