

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Bronchial Efeu Tabletten

Wirkstoffe:

15 mg Efeublätterpulver,
17 mg Efeublätter-Trochenextrakt,
Filmtabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Bronchial Efeu Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Bronchial Efeu Tabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten beachten?
3. Wie sind Bronchial Efeu Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Bronchial Efeu Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND BRONCHIAL EFEU TABLETTEEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Anwendungsgebiete

Bronchial Efeu Tabletten sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON BRONCHIAL EFEU TABLETTEN BEACHTEN?**

Bronchial Efeu Tabletten dürfen nicht eingenommen werden

bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Efeu, Pflanzen aus der Familie der Araliengewächse (z.B. Strahlenaralie (Schefflera), Ginseng (Panax) oder gegen einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten ist erforderlich

Bei Fieber, Atemnot, eitrigem oder blutigem Auswurf, sowie bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder unklaren Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten ist für Patienten mit Magenentzündungen oder Magengeschwüren geboten, da Bronchial Efeu Tabletten Reizungen der Magenschleimhaut verursachen können.

Bronchial Efeu Tabletten sollten im Rahmen der Selbstmedikation nicht zusammen mit anderen Hustenpräparaten angewendet werden.

Bei fortdauernden Krankheitssymptomen, oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufgesucht werden.

Bei Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten mit anderen Arzneimitteln ist Folgendes zu beachten

Zu möglichen Wechselwirkungen liegen keine Untersuchungen vor. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung von Bronchial Efeu Tabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Sie sollten deshalb in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bronchial Efeu Tabletten

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Bronchial Efeu Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE SIND BRONCHIAL EFEU TABLETTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Bronchial Efeu Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die übliche Dosierung ist:

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
3-mal täglich 1 Filmtablette.

Für Kinder unter 12 Jahren ist die Anwendung nicht vorgesehen.

Dosierungsangaben bei eingeschränkter Leber- und/ oder Nierenfunktion:
Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Leber- und/oder Nierenfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Filmtabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise einem Glas Wasser, ein.

Dauer der Anwendung

Nehmen Sie Bronchial Efeu Tabletten im Rahmen der Selbstmedikation nicht länger als eine Woche ein. Bei Beschwerden, die länger als eine Woche dauern, ist ein Arzt aufzusuchen. Bitte beachten Sie auch die Angaben im Abschnitt 2 „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten ist erforderlich“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Bronchial Efeu Tabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Bronchial Efeu Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme von 1-2 Tabletten mehr als empfohlen, hat normalerweise keinerlei Folgen. Die Einnahme von deutlich darüber hinaus gehenden Mengen kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle hervorrufen.

Wenn Sie die Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Bronchial Efeu Tabletten abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Bronchial Efeu Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Nach der Einnahme von Efeu-haltigen Arzneimitteln können allergische Reaktionen wie Hautreaktionen (Pusteln, Quaddeln, Nesselsucht, Juckreiz) sowie Schleimhautschwellungen und Atemnot auftreten.

Bei empfindlichen Personen können Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auftreten.

Die Häufigkeit der Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen Bronchial Efeu Tabletten nicht nochmals eingenommen werden. Gegebenenfalls ist ein Arzt aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND BRONCHIAL EFEU TABLETTEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel bzw. dem Blister angegebenen Verfalldatum „verwendbar bis“ nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 30 °C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Bronchial Efeu Tabletten enthalten

Die Wirkstoffe sind:
Efeublätterpulver, Efeublätter-Trockenextrakt

1 Filmtablette enthält:
15 mg Efeublätterpulver
17 mg Trockenextrakt aus Efeublättern (4-6:1), Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, hochdisperses Siliciumdioxid, Croscarmellose-Natrium, mikrokristalline Cellulose, Calciumstearat (Ph.Eur.), langkettige Partialglyceride, Schellack (gebleicht und wachsfrei), natives Rizinusöl, Talkum

1 Tablette entspricht 0,02 BE

Erhältliche Packungsgrößen:

Originalpackungen mit 20, (40, 60 bzw. 84) Filmtabletten

Pharmazeutischer Unternehmer:

Aenova IP GmbH, Temmlerstraße 2, 35039 Marburg
oder ggf. Mitvertreiber (Name/Anschrift)

Registrierungsinhaber:

Aenova IP GmbH, Temmlerstraße 2, 35039 Marburg

Hersteller:

Swiss Caps GmbH, Grassingerstraße 9, 83043 Bad Aibling
oder ggf. anderer für die Endfreigabe gemeldeter Hersteller (Name/Anschrift)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im
September 2018**