# Gebrauchsinformation: Information für Anwender

# Bronchialtee TAD® Pharma,

Granulat

Zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahren und Erwachsenen

Wirkstoffe:

Thymiankrauttrockenextrakt, Efeublättertrockenextrakt

# Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

- 1. Was ist Bronchialtee TAD Pharma und wofür wird er angewendet?
- 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bronchialtee TAD Pharma beachten?
- 3. Wie ist Bronchialtee TAD Pharma anzuwenden?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Bronchialtee TAD Pharma aufzubewahren?
- 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

# 1. Was ist Bronchialtee TAD Pharma und wofür wird er angewendet?

Bronchialtee TAD Pharma ist ein pflanzliches Arzneimittel bei katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege.

#### Anwendungsgebiet

Erkältungskrankheiten (Katarrhe) der oberen Atemwege, Linderung der Beschwerden bei Bronchitis.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

# 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bronchialtee TAD Pharma beachten?

# Bronchialtee TAD Pharma darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen Lippenblütler (z. B. Thymian und Oregano) sowie Zubereitungen aus Efeu, Fenchel, Anis oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Einnahme von Bronchialtee TAD Pharma zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aus der verbreiteten Anwendung von Thymian und Efeu als Arzneimittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Ergebnisse ausreichender Untersuchungen liegen jedoch nicht vor. Daher sollte Bronchialtee TAD Pharma in Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

# Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

# Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bronchialtee TAD Pharma

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Zucker) und Glucose. Bitte nehmen Sie Bronchialtee TAD Pharma erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Messlöffel (3 g) enthält 2,8 g Sucrose (Zucker) und Glucose entsprechend ca. 0,23 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Bronchialtee TAD Pharma kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

#### 3. Wie ist Bronchialtee TAD Pharma anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

3-mal täglich 1 Messlöffel Granulat (3 g) in eine Tasse geben, mit heißem Wasser übergießen, umrühren und trinken.

### Art der Anwendung

Zum Einnehmen nach Auflösen

#### Dauer der Anwendung

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

# Häufigkeit der Anwendung

Morgens, mittags und abends einen Messlöffel Granulat in eine Tasse geben, mit heißem Wasser übergießen, umrühren und trinken.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Bronchialtee TAD Pharma zu stark oder zu schwach ist.

# Wenn Sie eine größere Menge Bronchialtee TAD Pharma eingenommen haben, als Sie sollten

In diesem Fall können Symptome wie Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auftreten. Verständigen Sie einen Arzt! Er wird die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

#### Wenn Sie die Einnahme von Bronchialtee TAD Pharma vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie Ihre Arzneimitteleinnahme im normalen Rhythmus in der vorgeschriebenen Dosierung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

### Mögliche Nebenwirkungen:

Bei empfindlichen Personen können Magenbeschwerden auftreten.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist Bronchialtee TAD Pharma aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis nach "Verwendbar bis:" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

Das Glas nach Gebrauch fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Die Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt 12 Wochen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### Was Bronchialtee TAD Pharma enthält

Die Wirkstoffe sind:

100 g Granulat enthalten:

4,16 g Trockenextrakt aus Thymiankraut (6,0-10,0):1, Auszugsmittel: Ethanol 70 % (V/V)

0,37 g Trockenextrakt aus Efeublättern (4,0-7,5):1, Auszugsmittel: Ethanol 30 % (V/V)

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Sucrose (Zucker), Glucose, Dextrin, Siliziumdioxid, Anisöl, Fenchelöl, Farbstoff Zuckercouleur (E 150)

# Wie Bronchialtee TAD Pharma aussieht und Inhalt der Packung:

Braunes Glas mit Kunststoffschraubverschluss mit 50 g Granulat.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 5 27472 Cuxhaven

Telefon: (0 47 21) 6 06-0 Telefax: (0 47 21) 6 06-333 E-Mail: info@tad.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2016.

Die beigefügte Dosierhilfe (Messlöffel) ist ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. Hersteller der Dosierhilfe: G. Junghans Kunststoffwaren-Fabrik, Einsteinstraße 6, 37235 Hessisch Lichtenau