

Zukünftiger Wortlaut für die Packungsbeilage

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Bronchosyx comp.

Wirkstoffe:

Cephaelis ipecacuanha Dil. D4

Grindelia robusta Ø

Kalium iodatum Dil. D4

Mischung zum Einnehmen

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Bronchosyx comp.** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist **Bronchosyx comp.** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Bronchosyx comp.** beachten?
3. Wie ist **Bronchosyx comp.** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Bronchosyx comp.** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST BRONCHOSYX COMP. UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Bronchosyx comp. ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehört: Bronchitis

Hinweis:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON BRONCHOSYX COMP. BEACHTEN?

Bronchosyx comp. darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen Grindelia oder andere Korbblütler
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die anderen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von **Bronchosyx comp.** sind.
- bei Iodüberempfindlichkeit
- bei Alkoholkranken

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Bronchosyx comp. ist erforderlich:

Wegen des Alkoholgehaltes soll Bronchosyx comp. bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Bei Anwendung von Bronchosyx comp. zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

sind keine Besonderheiten zu beachten.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Bronchosyx comp.

Dieses Arzneimittel enthält 61 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST BRONCHOSYX COMP. ANZUWENDEN?

Wenden Sie Bronchosyx comp. immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen ein.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Bronchosyx comp.** zu stark oder zu schwach ist.

Wie lange sollten Sie Bronchosyx comp. einnehmen?

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenden Therapeuten erfolgen.

Allgemeiner Hinweis:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Bronchosyx comp. angewendet haben, als Sie sollten:

Über akute Vergiftungen durch **Bronchosyx comp.** ist beim Menschen bisher nicht berichtet worden. Setzen Sie bitte die Behandlung beim nächsten Anwenzeitpunkt mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie die Anwendung von Bronchosyx comp. vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern setzen Sie die Anwendung von **Bronchosyx comp.** mit der üblichen Dosis fort.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann **Bronchosyx comp.** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: <i>mehr als 1 von 10 Behandelten</i>	häufig: <i>mehr als 1 von 100 Behandelten</i>
Gelegentlich: <i>mehr als 1 von 1000 Behandelten</i>	Selten: <i>mehr als 1 von 10.000 Behandelten</i>
Sehr selten: <i>1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle</i>	

Mögliche Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können Magenschleimhautreizungen auftreten.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger- Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST BRONCHOSYX COMP. AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett „nach Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren!

Bitte bewahren Sie Bronchosyx comp. stets in dem Umkarton verschlossen (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) auf.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeit.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was Bronchosyx comp. enthält:**

10 g Mischung enthalten:

Wirkstoffe:

Cephaelis ipecacuanha Dil. D4 2,5 g

Grindelia robusta Ø 2,5 g

Kalium iodatum Dil. D4 2,5 g

Der sonstige Bestandteil ist:

Ethanol 62 % m/m 2,5 g

10 ml entsprechen 8,980 g

1 g entspricht 31 Tropfen

Wie Bronchosyx comp. aussieht und Inhalt der Packung

Bronchosyx comp. ist in der Originalpackung zu 30 ml und 50 ml Mischung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Syxyl GmbH & Co.KG, Gereonsmühlengasse 5, 50670 Köln
Telefon: 0800/1652400, Telefax: 0800/1652700
E-Mail: dialog@syxyl-service.de

Hersteller:

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Straße 41, 12277 Berlin

[Johannes Bürger Ysatisfabrik GmbH, Herzog-Julius-Straße 83, 38667 Bad Harzburg]

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt bearbeitet: []