

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Buer Lecithin plus Vitamine und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Buer Lecithin plus Vitamine beachten?
3. Wie ist Buer Lecithin plus Vitamine einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Buer Lecithin plus Vitamine aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

1. Was ist Buer Lecithin plus Vitamine und wofür wird es angewendet?

Buer Lecithin plus Vitamine ist ein traditionell angewendetes Arzneimittel zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Hinweis: Beim Auftreten von Krankheitszeichen sowie unklaren oder andauernden Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Buer Lecithin plus Vitamine beachten?

Wann dürfen Sie Buer Lecithin plus Vitamine nicht einnehmen?

Sie dürfen Buer Lecithin plus Vitamine nicht einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf einen der Wirkstoffe, Erdnuss, Soja oder gegen einen der sonstigen Bestandteile überempfindlich reagiert haben. Weiterhin dürfen Sie Buer Lecithin plus Vitamine nicht einnehmen, wenn Sie an einem Antiphospholipidsyndrom leiden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Buer Lecithin plus Vitamine enthält 16,4 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (1 Messbecher zu 20 ml) bis zu 2,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Bei der Einnahme mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit und der Anwendung bei Kindern beachten?

Auf Grund des Alkoholgehaltes von Buer Lecithin plus Vitamine besteht ein gesundheitliches Risiko für Schwangere. Bei Kindern sollte auf eine alkoholfreie Darreichungsform ausgewichen werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Buer Lecithin plus Vitamine

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Zucker). Bitte nehmen Sie Buer Lecithin plus Vitamine erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Buer Lecithin plus Vitamine einzunehmen?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Buer Lecithin plus Vitamine nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Buer Lecithin plus Vitamine sonst nicht richtig wirken kann!

Art der Anwendung

Flüssigkeit zum Einnehmen.

Wie viel von Buer Lecithin plus Vitamine und wie oft sollten Sie Buer Lecithin plus Vitamine anwenden?

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen täglich bis zu 3 Messbecher (zu je 20 ml) ein.

Buer Lecithin plus Vitamine enthält Alkohol, bei Kindern unter 12 Jahren sollte auf eine alkoholfreie Darreichungsform ausgewichen werden.

Hinweis für Diabetiker:

Buer Lecithin plus Vitamine enthält in einer Tagesdosis (60 ml) 5 g Saccharose entspr. ca. 0,42 BE.

Wie und wann sollten Sie Buer Lecithin plus Vitamine anwenden?

Die Einnahmezeiten sind nicht vorgeschrieben. Empfindlichen Personen empfehlen wir die Einnahme während der Mahlzeiten.

Wie lange sollten Sie Buer Lecithin plus Vitamine einnehmen?

Buer Lecithin plus Vitamine sollte nur solange eingenommen werden, wie der Bedarf durch eine geeignete Ernährung nicht gedeckt werden kann.

Was ist zu tun, wenn Buer Lecithin plus Vitamine in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Die mit dem Produkt zugeführte Alkoholmenge ist zu berücksichtigen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Buer Lecithin plus Vitamine Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10	häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1 000	selten: 1 bis 10 Behandelte von 10 000
sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10 000	nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Nicht bekannt: Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, weicher Stuhl, Durchfall).

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten: Schwere allergische Reaktionen gegen einzelne Inhaltsstoffe, Überempfindlichkeitsreaktionen aufgrund des Gehaltes an Farbstoff Ponceau 4 R (E 124).

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Hautausschlag und Nesselsucht.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen, insbesondere Überempfindlichkeitsreaktionen, bei sich beobachten, setzen Sie Buer Lecithin plus Vitamine ab und informieren Sie einen Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Buer Lecithin plus Vitamine aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und Faltschachtel aufgedruckt. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt: 12 Wochen.

Aufbewahrungsbedingungen

Buer Lecithin plus Vitamine soll nicht über 25 °C gelagert werden.

Vor Gebrauch bitte schütteln!

6. Weitere Informationen

100 ml Flüssigkeit enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile:

Phospholipide aus Sojabohnen 10,4 g, Riboflavinphosphat-Natrium 4,8 mg (entspr. ca. 3,5 mg Vitamin B₂), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B₆) 3,5 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂) 2,5 µg, Natrium-D-pantothenat 20,0 mg, Nicotinamid 35,0 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol; Sucrose (Saccharose); Natriumcitrat; Mannitol (Ph. Eur.); Kaliumsorbat; Natriumedetat; Kaffee Aroma; Farbstoff E 124; Natriumhydroxid; gereinigtes Wasser.

Inhalt der Packung

Packungen mit 500 ml bzw. 750 ml Flüssigkeit zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin
Tel.: 030/7 20 82-0, Telefax: 030/7 20 82-200
E-Mail: info@kade.de
www.kade.de

Hersteller

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Opelstr. 2
78467 Konstanz

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2014.