



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

## Canesten® Spray

Mit 1% Clotrimazol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Canesten Spray* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach ca. 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist *Canesten Spray* und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Canesten Spray* beachten ?
3. Wie ist *Canesten Spray* anzuwenden ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist *Canesten Spray* aufzubewahren ?
6. Weitere Informationen

#### **1. Was ist *Canesten Spray* und wofür wird es angewendet ?**

*Canesten Spray* ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzkrankungen (Mykosen) der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere, wie *Malassezia furfur*, sowie Hautinfektionen durch *Corynebacterium minutissimum*.

Diese können vorkommen z. B. in Form von:

Mykosen der Füße (Fußpilz), zwischen Zehen und Fingern, am Nagelfalz (Paronychien), auch in Verbindung mit Nagelmykosen; Hauterkrankungen, die mit *Canesten*-empfindlichen Erregern superinfiziert sind; Mykosen der Haut und Hautfalten; oberflächigen Candidosen; Pityriasis versicolor (Kleienpilzflechte); Infektionen mit *Corynebacterium minutissimum* (Erythrasma); seborrhoischer Dermatitis nur bei mikrobieller Mitbeteiligung o. a. Erreger.

Clotrimazol, der Wirkstoff in *Canesten Spray* dringt in die befallenen Hautschichten ein und greift dort den Pilz an. Die Folge: der Pilz stirbt ab oder wird in seinem Wachstum gehemmt.

#### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Canesten Spray* beachten ?**

***Canesten Spray* darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile sind.

### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Canesten Spray ist erforderlich**

*Canesten Spray* darf nicht in die Augen gelangen.

Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Die Lösung ist aufgrund des Propanolgehaltes entzündlich.

### **Bei Anwendung von Canesten Spray mit anderen Arzneimitteln**

sind bislang keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie *Canesten Spray* anwenden, wie in der "Dosierungsanleitung" beschrieben oder von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlen, wird der Wirkstoff Clotrimazol nur in sehr geringer Menge in den Körper aufgenommen; mit einer systemischen Wirkung (Wirkung auf andere Organe) ist deshalb nicht zu rechnen. Studien zur Anwendung von *Canesten Spray* während der Schwangerschaft liegen nicht vor. Während der Stillzeit sollte *Canesten Spray* nicht an der milchgebenden Brust angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## **3. Wie ist Canesten Spray anzuwenden ?**

Wenden Sie *Canesten Spray* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

*Canesten Spray* 1-3mal täglich auf die erkrankte Haut und die angrenzenden gesunden Hautbereiche dünn und gleichmäßig aufsprühen.

Um das Risiko einer Reinfektion zu verringern, kann *Canesten Spray* auch in kontaminierte, gut ausgetrocknete Schuhe und Strümpfe gesprüht werden.

### **Dauer der Anwendung**

Die Behandlungsdauer ist unter anderem abhängig vom Ausmaß und Ort der Erkrankung. Um eine vollständige Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung nicht nach dem Abklingen der Beschwerden abgebrochen, sondern bis zu einer Therapiedauer von mindestens 4 Wochen konsequent fortgeführt werden. Pityriasis versicolor heilt im Allgemeinen in 1-3 Wochen und Erythrasma in 2-4 Wochen ab.

Bei Fußpilz sollte - um Rückfällen vorzubeugen - trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen hinaus weiterbehandelt werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge Canesten Spray angewendet haben, als Sie sollten**

Folgen der Anwendung zu großer Mengen von *Canesten Spray* sind nicht bekannt; es liegen keine Berichte hierzu vor.

### **Wenn Sie die Anwendung von Canesten Spray vergessen haben**

Wenden Sie beim nächsten Mal nicht eine größere Menge *Canesten Spray* an, sondern setzen Sie die Behandlung wie empfohlen fort.

### **Wenn Sie die Anwendung von Canesten Spray abbrechen**

Um eine vollständige Ausheilung der Pilzinfektion zu erreichen und einem Rückfall vorzubeugen, sollten Sie möglichst nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt die Behandlung vorzeitig beenden oder unterbrechen. Wenn Sie dies dennoch tun, ist eine Wiederkehr der Beschwerden zu befürchten, da Ihre Pilzerkrankung wahrscheinlich noch nicht richtig ausgeheilt ist. Die Behandlung sollten Sie auch nicht nach dem Abklingen der Beschwerden abbrechen, sondern konsequent fortführen (wie unter "Dosierungsanleitung" empfohlen).

#### **Was können Sie zusätzlich tun?**

Wechseln Sie täglich Handtücher, Wäsche und Strümpfe, die mit der erkrankten Hautstelle in Berührung kommen. Schon diese einfache Maßnahme unterstützt die Ausheilung und verhindert eine Übertragung auf andere Körperstellen und Personen.

Vor jeder Anwendung von *Canesten Spray* sollten Sie die befallenen Hautstellen waschen, damit die lockeren Hautschuppen entfernt werden. Danach sollten Sie die Haut gründlich abtrocknen, bei Fußpilz insbesondere zwischen den Zehen, damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?**

Wie alle Arzneimittel kann *Canesten Spray* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b> mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b> weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b> weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
<b>Selten:</b> weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b> weniger als 1 von 10.000 Behandelten, oder unbekannt

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

##### **Haut**

##### Gelegentlich:

Vorübergehende irritative Hautreaktionen, wie z. B. Brennen, Stechen, Rötung. Es kann zu einer Austrocknung der behandelten Hautstellen kommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### **5. Wie ist Canesten Spray aufzubewahren ?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Plastikflasche und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Das Arzneimittel kann auch nach Anbruch noch bis zum Ende der Haltbarkeit verwendet werden.

## **6. Weitere Informationen**

### **Was enthält Canesten Spray:**

1 ml Spray enthält als Wirkstoff 0,01 g Clotrimazol (1 %).

Die sonstigen Bestandteile sind: Isopropylmyristat (Ph.Eur.), Macrogol 400, 2-Propanol (Ph.Eur.).

### **Inhalt der Packung**

Pumpspray zu 30 ml (N1).

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Bayer Vital GmbH, D-51368 Leverkusen

### **Hersteller**

KVP Pharma + Veterinär Produkte  
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

### **Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet**

September 2007