

apothekenpflichtig

Miconazol	Lösung	20 mg / 1 ml
Stoff	Darreichungsform	Menge

Anlage

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Castellani-Lösung mit Miconazol

Wirkstoff: 100 g Lösung enthalten 2 g Miconazol

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Apothekenpflichtig

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Castellani-Lösung mit Miconazol jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 10 – 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Castellani-Lösung mit Miconazol und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Castellani-Lösung mit Miconazol beachten?
3. Wie ist Castellani-Lösung mit Miconazol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Castellani-Lösung mit Miconazol aufzubewahren?

6. Weitere Informationen

1. **WAS IST CASTELLANI-LÖSUNG MIT MICONAZOL UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?**

Castellani-Lösung mit Miconazol ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzerkrankungen auf der Haut

Anwendungsgebiet:

- Pilzinfektionen der Haut, die auf Miconazol ansprechen (z.B. Fußpilz)

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CASTELLANI-LÖSUNG MIT MICONAZOL BEACHTEN?**

Castellani-Lösung mit Miconazol darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Miconazol oder einen der sonstigen Bestandteile von Castellani-Lösung mit Miconazol sind.
- bei Neugeborenen - insbesondere nicht bei solchen mit Zeichen der Unreife (Gefahr des Gasping-Syndroms aufgrund des Benzylalkoholgehaltes).
- bei Säuglingen und Kleinkindern
- bei nässenden Ekzemen (Entzündung der Haut)

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Castellani-Lösung mit Miconazol ist erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Castellani-Lösung mit Miconazol:

Das in Castellani-Lösung mit Miconazol enthaltene Propylenglykol kann Hautreizungen hervorrufen.

Bei Anwendung von Castellani-Lösung mit Miconazol mit anderen Arzneimitteln:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch bei äußerlicher Anwendung von Miconazol die Wirksamkeit blutgerinnungshemmender Mittel (z.B. Marcumar) verstärkt werden kann.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie können Castellani-Lösung mit Miconazol bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Schwangerschaft anwenden.

Sie können Castellani-Lösung mit Miconazol bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Stillzeit anwenden.

Um den direkten Kontakt Ihres Säuglings mit dem Wirkstoff zu vermeiden, sollten stillende Frauen Castellani-Lösung mit Miconazol während der Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Castellani-Lösung mit Miconazol hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

3. WIE IST CASTELLANI-LÖSUNG MIT MICONAZOL ANZUWENDEN?

Wenden Sie Castellani-Lösung mit Miconazol immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Castellani-Lösung mit Miconazol – jeweils mit frischem Wattestäbchen – 1 – 3 mal täglich auf die betroffenen Hautpartien gleichmäßig dünn aufgetragen.

Art der Anwendung

Lösung zum Auftragen auf die Haut

Dauer der Anwendung

Die Behandlungsdauer beträgt durchschnittlich 2 – 5 Wochen.

Die Behandlung sollte bis zum Verschwinden positiver Pilzkulturen durchgeführt werden, mindestens jedoch noch 14 Tage nach Abklingen der Beschwerden. Zwischen dem letzte Auftragen und dem Anlegen einer Pilzkultur sollte eine behandlungsfreie Zeitspanne vom 3 – 4 Tagen liegen, damit eventuell noch vorhandene Wirkstoffreste die Untersuchungsergebnisse nicht verfälschen.

Wenn Sie eine größere Menge Castellani-Lösung mit Miconazol angewendet haben, als Sie sollten

Eine kurzzeitige Anwendung zu hoher Dosen hat keine negativen Auswirkungen.

Wenn Sie die Anwendung von Castellani-Lösung mit Miconazol vergessen haben

Die kurzzeitige Unterbrechung der Behandlung mit Castellani-Lösung mit Miconazol hat keine negativen Auswirkungen.

Wenn Sie die Anwendung von Castellani-Lösung mit Miconazol abbrechen

Bitte brechen Sie die Behandlung mit Castellani-Lösung mit Miconazol nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab. Ihre Krankheit könnte sich hierdurch verschlechtern.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Castellani-Lösung mit Miconazol Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, beenden Sie die Behandlung mit Castellani-Lösung mit Miconazol und suchen Sie möglichst umgehend Ihren Arzt auf.

Gelegentlich können bei der Behandlung mit Castellani-Lösung mit Miconazol Hautreizungen mit Rötung, Stechen, Brennen auftreten.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Systemische (innere Organe betreffende) Wirkungen sind bei äußerlicher Anwendung bisher nicht bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST CASTELLANI-LÖSUNG MIT MICONAZOL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett bzw. Behältnis nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C lagern

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

Castellani-Lösung mit Miconazol ist nach Anbruch 6 Monate haltbar

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Castellani-Lösung mit Miconazol enthält:

100 g Castellani-Lösung mit Miconazol enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Miconazol 2,0 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Benzylalkohol, Ethanol 96 %, Propylenglykol, Glycerol, gereinigtes Wasser

Wie Castellani-Lösung mit Miconazol aussieht und Inhalt der Packung:

Castellani-Lösung mit Miconazol ist eine klare, farblose Lösung, in Braunglas-Flaschen von 10 ml [N1], 20 ml [N1], 100 ml [N3] Inhalt.

Pharmazeutischer Unternehmer

Antragsteller und Hersteller:

Dr. K. Hollborn & Söhne GmbH & Co. KG

Brahestraße 13

D-04347 Leipzig

Tel.: (0341)2 33 44 05

Fax: (0341)2 33 44 06

e-mail: Medizinchemie@hollborn.de

Internet: <http://www.hollborn.de>

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 05/2007.

Apothekenpflichtig!