

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation

#### Coenzyme compositum ad us. vet.

#### Name und Anschrift des Inhabers der Registrierung und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221-50100  
Telefax: 07221-501210  
E-Mail: info@heel.de

#### Bezeichnung des Tierarzneimittels

Coenzyme compositum ad us. vet.  
Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen

#### Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält:

##### Wirkstoffe:

Acidum ascorbicum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 15% (m/m))	22,0 mg
Acidum alpha-ketoglutaricum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Acidum cis-aconiticum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Acidum citricum Dil.	D8	22,0 mg
Acidum fumaricum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 86% (m/m))	22,0 mg
Acidum DL-malicum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Acidum succinicum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Adenosinum triphosphoricum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Barium oxalsuccinicum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Beta vulgaris var. conditiva e radice Dil.	D4 (HAB, Vorschrift 2a)	22,0 mg

Coenzym A Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Cysteinum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Hepar sulfuris Dil.	D10	22,0 mg
Nadidum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Natrium pyruvicum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Nicotinamidum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Pulsatilla pratensis Dil.	D6	22,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Sulfur Dil.	D10	22,0 mg
Thiaminum hydrochloricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Acidum thiocticum Dil.	D6 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Cerium oxalicum Dil.	D8 aquos	22,0 mg
Magnesium oroticum Dil.	D6 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Manganum phosphoricum Dil.	D6 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum Dil.	D6 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg

Die Bestandteile 1 – 21 werden über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 11 in Kombination mit Vorschrift 40a mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert.

#### Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid  
Wasser für Injektionszwecke

#### Anwendungsgebiet(e)

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

#### Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

#### Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte dem Tierarzt mit.

### **Zieltierart(en)**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen

### **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Coenzyme compositum ad us. vet. zur subkutanen Injektion.

Standarddosierung:

Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Pferd, Rind (über 500 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 10 ml
Pferd, Rind (bis zu 500 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 5 ml
Schwein:	1 mal täglich die Einzeldosis von 3-5 ml
Schaf, Ziege:	1 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 ml
Großer Hund (über 25 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 ml
Mittelgroßer Hund (15-25 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 2 ml
Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze:	1 mal täglich die Einzeldosis von 1-2 ml
Kaninchen:	1 mal täglich die Einzeldosis von 0,5 ml

Initial-/Akutdosierung:

Bei akuten Beschwerden kann die angegebene Einzeldosis anfangs nach 12 Stunden wiederholt werden, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:

Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1 bis 4 Tagen verabreichen.

Hinweis: Coenzyme compositum ad us. vet. sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

### **Wartezeit(en)**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Kaninchen:	Essbare Gewebe: Null Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege:	Milch: Null Stunden

### **Besondere Lagerungshinweise**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

## **Besondere Warnhinweise**

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Eine Injektion sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Keine bekannt.

### **Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:**

Zur Verträglichkeit von Coenzyme compositum ad us. vet. bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

### **Wechselwirkungen:**

Keine bekannt.

Wenn Coenzyme compositum ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

## **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

## **Weitere Angaben**

Packungsgrößen: 10 und 100 Ampullen zu 2,2 ml

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.