

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen

Desarell

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Desarell jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Desarell und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Desarell beachten?
3. Wie ist Desarell anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Desarell aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST DESARELL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Desarell ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DESARELL BEACHTEN?

Desarell darf nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Bienengift oder Ameisensäure oder einem der anderen arzneilich wirksamen oder einem der sonstigen Bestandteile von Desarell sind.

Bei Kindern unter 1 Jahr darf Desarell nicht angewendet werden.

Kinder

Wegen nicht ausreichend vorliegender Untersuchungen bei Kindern soll dieses Arzneimittel bei Kindern zwischen 1 und 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt um Rat.

Bei Anwendung von Desarell mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung hat Desarell keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

3. WIE IST DESARELL ANZUWENDEN?

Wenden Sie Desarell immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Desarell sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anderes verordnet, erhalten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren täglich 1 bis 2 ml Desarell subcutan injiziert.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Die Ampullen sollen nach dem Öffnen sofort verwendet werden.

Angebrochene Ampullen dürfen nicht aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden, da die Sterilität der Injektionslösung nicht mehr gewährleistet ist.

Wie lange sollten Sie Desarell anwenden?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Desarell angewendet haben, als Sie sollten

Aufgrund der Injektionstechnik sind Überdosierungen ausgeschlossen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es kann zu Rötungen an der Einstichstelle kommen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST DESARELL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Ampulle angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Desarell enthält:

1 Ampulle zu 2 ml enthält:

Wirkstoffe:

Apis mellifica D6 dil. 0,4 ml

Acidum formicicum D6 dil. 0,4 ml

Thryallis glauca D6 dil. 0,6 ml

Cardiospermum halicacabum D4 dil. 0,6 ml

Alle Bestandteile wurden über die letzten beiden Potenzstufen gemeinsam potenziert.

Wie Desarell aussieht und Inhalt der Packung:

Originalpackungen mit 10 Ampullen zu je 2 ml flüssige Verdünnung zur Injektion.

Reg.-Nr. 31693.00.00

apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

SANORELL PHARMA GmbH & Co KG

D-72270 Baiersbronn • Reichtmurgstrasse 27

Produktion und Vertrieb:

D-77815 Bühl/Baden • Hurststraße 31

Tel. 07223 – 93370 • Fax 07223 - 933750 • www.sanorell.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im [] überarbeitet.