

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### ***desmanol® care 700 mg/g + 99 mg/g , Lösung***

Wirkstoffe: Propan-2-ol, Ethanol 96%

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonal an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist desmanol® care und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von desmanol® care beachten?
3. Wie ist desmanol® care anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist desmanol® care aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. WAS IST DESMANOL® CARE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

desmanol® care wird zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion angewendet. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (incl. Mykobakterien), Hefepilze \* und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung "begrenzt viruzid")\*\* ein.

\*: gemäß DGHM/VAH-Richtlinien

\*\* : Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

#### **Anwendungsgebiete:**

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DESMANOL® CARE BEACHTEN?

### **desmanol® care darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie allergisch gegen Propan-2-ol, Ethanol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptik von Schleimhäuten und in unmittelbarer Umgebung des Auges

### **Warnhinweis und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal bevor Sie desmanol® care anwenden.

- Nicht in offene Flamme sprühen, von Zündquellen fernhalten, leicht entzündbar
- Nicht einnehmen!
- Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich eine Reizung entwickelt und anhält.

*Gültig für Gebindegrößen ab 1000 ml (nicht relevant bei 1000ml mit integrierter Einweg-Dosierpumpe)*

Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

### **Anwendung von desmanol® care mit anderen Arzneimitteln:**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol** Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

## 3. WIE IST DESMANOL® CARE ANZUWENDEN?

Wieviel von desmanol® care und wie oft sollten Sie desmanol® care anwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Hygienische Händedesinfektion: Originallösung 30 Sekunden einreiben.

Chirurgische Händedesinfektion: Originallösung 90 Sekunden einreiben.

Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch die Originallösung feucht gehalten werden.

## **WENN SIE EINE GRÖßERE MENGE DESMANOL® CARE ANGEWENDET HABEN, ALS SIE SOLLTEN...**

Erkenntnisse zu Überdosierungen liegen nicht vor. Eine Überdosierung ist jedoch bei einer topischen Zubereitung sehr unwahrscheinlich.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann desmanol® care Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

|               |  |
|---------------|--|
| Sehr häufig:  | mehr als 1 von 10 Behandelten                                  |
| Häufig:       | weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten      |
| Gelegentlich: | weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten    |
| Selten:       | weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten |
| Sehr selten:  | weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt           |

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktekzeme) sind möglich.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen (siehe Angaben unten). Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: <http://www.bfarm.de>

### **5. WIE IST DESMANOL® CARE AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen :**

Nicht im Kühlschrank lagern (bei 2-8°C)

Nicht über 25°C lagern

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:**

desmanol® care ist nach Anbruch 12 Monate haltbar.

**6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN****Was desmanol® care enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

|              |        |
|--------------|--------|
| Propan-2-ol  | 70,0 g |
| Ethanol, 96% | 9,9 g  |

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend) (Ph.Eur.), Dexpanthenol, Methylethylketon

**Wie desmanol® care aussieht und Inhalt der Packung:**

desmanol® care ist eine klare, farblose Lösung und in folgenden Packungsgrößen zugelassen:

50 ml mit Klappdeckel

100 ml mit Klappdeckel

500 ml mit Klappdeckel oder mit integrierter Einweg-Dosierpumpe,

1 L mit Klappdeckel oder mit integrierter Einweg-Dosierpumpe,

1 L Euroflasche mit Schraubverschluss

5 L Kanister mit Schraubverschluss

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Schülke & Mayr GmbH  
D-22840 Norderstedt  
info@schuelke.com  
Tel. +49 40/521 00-0

**Zulassungsnummer:**

6001985.00.00

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2017.

---

#### Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

|  | Einwirkzeit |
|--|-------------|
| „begrenzt viruzid“*<br>(inkl HIV, HBV und HCV) | 15 s        |
| Rotavirus                                      | 10 s        |
| Norovirus (murines)                            | 15 s        |

\*gem. DVV-/RKI-Leitlinie 2015

Die Spenderanwendung der Packungsgrößen mit der Dosierpumpe ist mit dem

