

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID 750 mg** TABLETTEN

Glucosaminhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Nehmen sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2-3 Monaten nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** beachten?
3. Wie ist Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST DOPPELHERZ® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als nichtsteroidale entzündungshemmende (Antiphlogistika) und antirheumatische (Antirheumatika) Arzneimittel bezeichnet werden.

Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** wird zur Linderung von Symptomen leichter bis mittelschwerer Arthrose des Kniegelenks angewendet.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID BEACHTEN?

- Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** darf nicht eingenommen werden, wenn Sie:
- allergisch gegen Glucosamin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
 - überempfindlich (allergisch) gegen **Schalentiere** sind, da Glucosamin aus Schalentieren hergestellt wird.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID anwenden wenn Sie

- an **eingeschränkter Glucosetoleranz** leiden. Häufigere Messungen des Blutzuckerspiegels können zu Beginn der Behandlung mit Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** erforderlich sein.
- ein **bekanntes erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen** haben, da bei Patienten, die mit Glucosamin behandelt wurden, in einigen Fällen eine Erhöhung des Cholesterinspiegels im Blut beobachtet wurde.
- an **Asthma** leiden. Wenn Sie mit der Einnahme von Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** beginnen, müssen Sie auf eine mögliche Verstärkung der Symptome vorbereitet sein.

Doppelherz® Glucosamin-Hydrochlorid wird für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Anwendung von Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Vorsicht ist angebracht, wenn Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** zusammen mit anderen Arzneimitteln und insbesondere mit

- Bestimmten Arzneimittelarten, die zur Hemmung der Blutgerinnung angewendet werden (z. B. Warfarin, Dicumarol, Phenprocumon, Acenocumarol und Fluindion). Die Wirkung dieser Arzneimittel kann stärker sein, wenn sie mit Glucosamin angewendet werden. Patienten die mit solchen Kombinationen behandelt werden, sollten daher bei der Einleitung oder Beendigung einer Glucosamin-Therapie besonders sorgfältig überwacht werden.
- Tetracyclinen (Antibiotika gegen Infektionen) angewendet wird.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Bei Einnahme von Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID zusammen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Getränken und Alkohol

Die Tabletten können mit oder ohne Nahrungsmittel eingenommen werden und sollten mit Wasser oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit geschluckt werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** sollte nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden. Die Einnahme von Doppelherz® **GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID** während der Stillzeit wird nicht empfohlen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Bei Schwindel oder Benommenheit wird empfohlen, vom Führen von Fahrzeugen oder dem Bedienen von Maschinen abzusehen.

3. WIE IST Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung:

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 1-mal täglich 2 Tabletten (1500 mg Glucosaminhydrochlorid, entsprechend 1250 mg Glucosamin).

Glucosamin ist nicht angezeigt für die Behandlung akuter schmerzhafter Symptome, da eine Linderung der Symptome (insbesondere Schmerzlinderung) erst einige Wochen nach Beginn der Behandlung eintritt, in manchen Fällen noch später.

Doppelherz® Glucosamin-Hydrochlorid sollte nicht über einen längeren Zeitraum als 2-3 Monaten ohne Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.

Zum Einnehmen.

Die Tabletten sollten mit etwas Wasser oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit geschluckt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID eingenommen haben, als Sie sollten, müssen Sie Kontakt zu Ihrem Arzt oder einem Krankenhaus aufnehmen. Bei Überdosierung mit Glucosamin können die folgenden Anzeichen oder Symptome auftreten: Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit, Gelenkschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung. Brechen Sie die Behandlung mit Glucosamin ab, wenn Anzeichen einer Überdosierung auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Wenn der Zeitpunkt der nächsten Einnahme fast erreicht ist, überspringen Sie die vergessene Dosis und setzen Sie die Behandlung mit Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID wie gewohnt fort.

Wenn Sie die Einnahme von Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID abbrechen

Können Ihre Symptome wieder auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Brechen Sie die Behandlung mit Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID sofort ab und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie Symptome eines Angioödems bei sich beobachten; die Symptome sind z.B.

- geschwollenes Gesicht, Zunge oder Hals
- Schluckbeschwerden

Nesselausschlag und Schwierigkeiten beim Atmen.

Häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen):

Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen, Durchfall, Verstopfung

Gelegentlich (kann mehr als 1 von 100 Behandelten betreffen):

Ekzem, Juckreiz, Hautrötung

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Nesselausschlag, Schwellungen/Anschwellen der Fußgelenke, der Beine und der Füße, Schwindel, Erbrechen, Beeinträchtigung der körpereigenen Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Diabetes mellitus. Erhöhte Leberenzyme und Gelbsucht.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Blisterpackung/dem Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren; um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Nicht über 30°C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall.. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. . Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID enthält:

Der Wirkstoff ist Glucosaminhydrochlorid.

Jede Tablette enthält 750 mg Glucosaminhydrochlorid (entsprechend 625 mg Glucosamin).

Die sonstigen Bestandteile sind: mikrokristalline Cellulose, Hyprolöse, Hyprolöse (5.0-16.0% Hydroxypropoxy-Gruppen), Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

Wie Doppelherz® GLUCOSAMIN-HYDROCHLORID aussieht und der Inhalt der Packung:

Die 10x18,75 mm große Tablette ist weiß bis hellbeige, oval mit einer Bruchkerbe auf der einen Seite und mit einem „G“ auf der anderen Seite gekennzeichnet.

Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der Tablette für ein erleichtertes Schlucken und nicht zum Aufteilen in gleiche Dosen.

PVC/PVDC-Aluminium-Blisterpackung im Umkarton.

Packungsgröße: 20, 40, 60 und 180 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Laboratoires Expanscience

1 place des Saisons

92048 Paris La Défense Cedex

Frankreich

Hersteller

Haupt Pharma Wülfing GmbH
Bethelner Landstr. 18
31028 Gronau
Deutschland

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

Deutschland	Doppelherz Glucosaminhydrochlorid
Schweden	Glucosamine Navamedic

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im. 07/2018