

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Echinacea Saft IMG zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungen Flüssigkeit zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr

Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Echinacea Saft IMG zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungen (im Folgenden nur „Echinacea Saft IMG“) und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinacea Saft IMG beachten?
3. Wie ist Echinacea Saft IMG einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Echinacea Saft IMG aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Echinacea Saft IMG und wofür wird er angewendet?

Echinacea Saft IMG ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten. Er wird zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungskrankheiten angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinacea Saft IMG beachten?

Echinacea Saft IMG darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Purpursonnenhutkraut, andere Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- von Säuglingen unter einem Jahr.
- aus grundsätzlichen Erwägungen ist Echinacea Saft IMG nicht anzuwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen (wie Tuberkulose, Sarkoidose), systemischen Erkrankungen des weißen Blutzellsystems (z. B. Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, Leukosen), Autoimmunerkrankungen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes [Kollagenosen], multipler Sklerose), Immundefiziten (AIDS/HIV-Infektionen), Immunsuppression (z. B. nach Organ- oder Knochenmarktransplantation, Chemotherapie bei Krebserkrankungen), chronischen Viruserkrankungen, allergischer Diathese (z. B. Asthma, allergisch bedingter Hautausschlag).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn bei Ihnen Atemnot, Fieber, eitriger oder blutiger Auswurf auftritt oder Ihre Beschwerden länger als 10 Tage andauern, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Kinder

Echinacea Saft IMG darf nicht bei Säuglingen (unter 1 Jahr) angewendet werden.

Einnahme von Echinacea Saft IMG zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Einnahme von Echinacea Saft IMG während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. Wie ist Echinacea Saft IMG einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Messen Sie die empfohlene Dosis mit dem beigegeführten Messbecher ab. Die empfohlene Dosis können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Alter	Einzeldosis	Anzahl Dosen pro Tag
1 - 4 Jahre	5 ml	2 – 3-mal täglich
5 - 12 Jahre	10 ml	2 – 3-mal täglich
über 12 Jahre und Erwachsene	15 ml	2-mal täglich

Anwendung bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Dauer der Anwendung

Nehmen Sie Echinacea Saft IMG ohne ärztlichen Rat nicht länger als 10 Tage durchgehend ein.

Wenn Sie eine größere Menge Echinacea Saft IMG eingenommen haben, als Sie sollten

Von den pflanzlichen Bestandteilen in Echinacea Saft IMG sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten. Bei Auftreten von Beschwerden sollten Sie jedoch Ihren Arzt informieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

- Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Juckreiz, Atemnot, Schwindel, Blutdruckabfall, Stevens-Johnson-Syndrom, Gesichtsschwellung/Schwellung der Haut und/oder Schleimhaut, obstruktive Bronchospasmen, Asthma, anaphylaktischer Schock).
- Magen- und Darmbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
- Bei allergisch veranlagten Patienten können allergische Reaktionen ausgelöst werden.
- Die Einnahme von Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Purpursonnenhutkraut wird mit dem Auftreten von Immunerkrankungen in Verbindung gebracht.
- Bei Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) können Blutbildveränderungen (Leukopenie, eine Verminderung der Zahl der weißen Blutkörperchen) auftreten.

Sollten Sie Schwellungen im Gesicht, Mund und/oder Rachenraum bzw. allergische Reaktionen der Atemwege bei sich beobachten, setzen Sie Echinacea Saft IMG ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Echinacea Saft IMG aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch 8 Wochen haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Echinacea Saft IMG enthält

- Der Wirkstoff ist: Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet. 100 g Flüssigkeit enthalten 1,076 g getrockneten Presssaft aus frischem blühendem Purpursonnenhutkraut (22 – 65 : 1).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Kaliumsorbat (Ph.Eur.), Citronensäure, Xanthangummi, Xylitol, Orangenaroma, gereinigtes Wasser.

Wie Echinacea Saft IMG aussieht und Inhalt der Packung

Echinacea Saft IMG ist eine braune, viskose Flüssigkeit. Er ist in einer Flasche mit 150 ml Flüssigkeit erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

<Mitvertrieb>

<Inter Pharm Arzneimittel GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 6
44534 Lünen>

Hersteller

Inter Pharm Arzneimittel GmbH
Kurt-Schumacher-Str. 6
44534 Lünen

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2020.