Gebrauchsinformation

Information für Anwender

Exhust Sirup

Darreichungsform: Sirup

Wirkstoffe: Trockenextrakt aus Efeublättern, Süßholzwurzel und Thymiankraut

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Gebrauchsinformation steht:

1. Was ist Exhust Sirup und wofür wird es eingenommen?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Exhust Sirup beachten?
3. Wie ist Exhust Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Exhust Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Exhust Sirup und wofür wird es eingenommen?

Exhust Sirup ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Exhust Sirup wird angewendet:

– Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Exhust Sirup beachten?

Exhust Sirup darf nicht eingenommen werden,

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Efeu, Süßholz, Thymian oder anderen Lamiaceen (Lippenblütlern), Birke, Beifuß, Sellerie oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Exhust Sirup einnehmen.

– Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber, wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

– Bei gleichzeitiger Einnahme hormoneller Empfängnisverhütungsmittel („Pille") sollten Sie Exhust Sirup erst nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 4 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 4 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahm
Arzneim

Informier
einnehme
andere A

Bei gleic
(„Pille")
wurzel di

Schwang

Wenn Sie
schwange
vor der E
Rat.
Zur Anw
liegen ke
Schwang

Exhust S

Bitte neh
ein, wen
gegenübe
5 ml entl
Wenn Sie
sichtigen
Der Kalo
kann eine

3. Wie

Nehmen
Arzt oder
Fragen S
cher sind

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder von 4-5 Jahren	2 x täglich 3 ml
Kinder von 6-12 Jahren	2-3 x täglich 4 ml
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	3 x täglich 5 ml

Für Kinder unter 4 Jahren ist die Anwendung nicht vorgesehen.

Art der Anwendung
Nehmen Sie die Flüssigkeit bitte unverdünnt ein und trinken Sie ausreichend Flüssigkeit nach (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Dauer der Anwendung
Ohne ärztlichen Rat sollte Exhust Sirup nicht länger als 1 Woche eingenommen werden.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Exhust Sirup eingenommen haben, als Sie sollten
In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Exhust Sirup vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist, oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10 000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelter von 10 000
Nicht bekannt	Häufigkeiten auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Gelegentlich

- Magenbeschwerden wie Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen

Sehr selten

- Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum (Quincke-Ödem)
- bei gleichzeitiger längerer Einnahme von Süßholzwurzel und hormonellen Empfängnisverhütungsmitteln („Pille") wurde Bluthochdruck oder Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe wie z. B. in den Beinen beobachtet.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie

Bewahre

Sie dürf
Faltschac
mehr ver
angegebe

Aufbewa
Nicht übe
Hinweis
Die Haltb

6. Inha

Was Exh
100 ml (e
Trockene
rhizinsäu
Trockene
Ethanol 7
Trockene
Ethanol 3

Die sonst
Kaliumso
Citronens
substanz)

Das Ausz
Es ist im

Wie Exh
Exhust S
nach Süß
Schraubv
Packung
Bündelpa

Pharmazeutischer Unternehmer

Engelhard Arzneimittel GmbH
& Co. KG
Herzbergstraße 3
61138 Niederdorfelden
Tel.: +49 6101 539-300
Fax: +49 6101 539-315
info@engelhard.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:
September 2015