

**Gebrauchsinformation:** Information für Anwender

## **Formidium® D6**

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Wirkstoff: Acidum formicicum D6

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Formidium® D6 und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Formidium® D6 beachten?
3. Wie ist Formidium® D6 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Formidium® D6 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. Was ist Formidium® D6 und wofür wird es angewendet?**

Formidium® D6 ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Hauterkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Allergien, Ekzeme, Rheumatismus.

### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Formidium® D6 beachten?**

**Formidium® D6 darf nicht angewendet werden,** wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei anhaltenden oder neu auftretenden Beschwerden sowie bei akuten Gelenkbeschwerden, die mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Anwendung von Formidium® D6 zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Eine Beeinflussung der Wirkung von Formidium® D6 durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

### **Anwendung von Formidium® D6 zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## **3. Wie ist Formidium® D6 anzuwenden?**


Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Von Formidium® D6 sollten 2- bis 3-mal wöchentlich 1-2 ml subkutan oder intravenös injiziert werden. Je nach Reaktionslage des Patienten können die Intervalle zwischen den einzelnen Injektionen auch verlängert werden.

Formidium® D6 wird unter die Haut (subkutan, s.c.) oder in eine Vene (intravenös, i.v.) injiziert. Die Anwendung sollte nur durch Personen erfolgen, die die jeweilige Injektionsart sicher beherrschen.


Formidium® D6 Ampullen sind OPC (one-point-cut)-Ampullen, ein Anfeilen vor dem Öffnen ist nicht erforderlich. Die Handhabung der Ampullen erfolgt nach folgendem Schema:

Abb. 1



Farbigen Punkt nach oben-vorne (siehe Abb. 1).  
Im oberen Ampullenteil befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.

Abb. 2



Oberen Ampullenteil nach hinten-unten abbrechen (siehe Abb. 2)

Der Restinhalt von angebrochenen Ampullen ist zu verwerfen.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Wenn eine größere Menge Formidium® D6 angewendet wurde, als vorgegeben**

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls dieses Arzneimittel erheblich überdosiert wurde, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

**Wenn die Anwendung von Formidium® D6 vergessen wurde**

Wenn eine Anwendung ausgelassen wurde, sollte nicht die doppelte Dosis verabreicht werden.

**Wenn die Anwendung von Formidium® D6 abgebrochen wird**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn die Anwendung von Formidium® D6 abgebrochen wird.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

*Hinweis:* Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte das Arzneimittel abgesetzt und Ihr Arzt befragt werden.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Formidium® D6 aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Das Arzneimittel darf nach dem auf Ampulle und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr angewendet werden.

**6. Weitere Informationen**

**Was Formidium® D6 enthält**

*Der Wirkstoff ist:* Acidum formicicum Dil. D6 1 ml  
in 1 Ampulle.

**Wie Formidium® D6 aussieht und Inhalt der Packung**

Formidium® D6 ist eine klare und farblose Injektionslösung.

Packung mit 8 Ampullen zu 1 ml  
Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
info@dhu.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2015.**

---

Nach den Grundsätzen der Homöopathie erfolgt jede Behandlung mit einem individuell auf den Patienten und sein jeweiliges Krankheitsbild abgestimmten homöopathischen Arzneimittel. Langjährige Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sich bei bestimmten Krankheitsbildern einzelne Arzneimittel häufig besonders gut bewährt haben. So hat sich Acidum formicicum, der wirksame Bestandteil von Formidium® D6, vielfach bei der Behandlung von Erkrankungen bewährt, die auf Störungen des Immunsystems bzw. des Stoffwechsels beruhen wie Allergien und Ekzeme, aber auch Rheumatismus der Gelenke und Muskeln. Acidum formicicum, die Ameisensäure, wirkt im Sinne einer Reiztherapie und fördert dabei durch eine Umstimmung der Reaktionslage die Selbstheilungskraft des Körpers.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6568835.00.00