

## **PACKUNGSBEILAGE**

### **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

#### **Gallensteintropfen comp EKF**

Homöopathisches Arzneimittel bei Leber-Galle-Störungen  
Mischung zum Einnehmen

Wirkstoffe:

Berberis vulgaris Dil. D3, Chelidonium majus Dil. D4, Cholesterinum Dil. D3,  
Lycopodium clavatum Dil. D20

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind Gallensteintropfen comp EKF und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gallensteintropfen comp EKF beachten?
3. Wie sind Gallensteintropfen comp EKF einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Gallensteintropfen comp EKF aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### **1. Was sind Gallensteintropfen comp EKF und wofür werden sie angewendet?**

Homöopathisches Arzneimittel bei Leber-Galle-Störungen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehören: Leber-Galle-Störungen

Hinweis: Bei Gelbsucht, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Gallenstropfen comp EKF beachten?

### Gallenstropfen comp EKF dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie alkoholkrank sind
- bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kindern aufgrund des Bestandteils Schöllkraut

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei bestehenden Lebererkrankungen oder solchen in der Vorgeschichte, bei gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe, bei Verschluss der Gallenwege, Gallenblasenemphysem, Ileus und Gallensteinleiden dürfen Sie Gallenstropfen comp EKF nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

### Einnahme von Gallenstropfen comp EKF zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

### Einnahme von Gallenstropfen comp EKF zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme der für Gallenstropfen comp EKF empfohlenen Dosen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Gallenstropfen comp EKF enthalten 65 Vol.-% Alkohol.

## 3. Wie sind Gallenstropfen comp EKF einzunehmen?

Die empfohlene Dosis beträgt:

Dosierung	Akute Zustände	Chronische Verlaufsformen
	Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich	1-3-mal täglich
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	<b>je 5 Tropfen</b> maximal 30 Tropfen täglich	<b>je 5 Tropfen</b> maximal 15 Tropfen täglich

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### **Art der Anwendung**

Tropfen Sie Gallenstropfen comp EKF in ein Glas Wasser und trinken Sie dann das Glas vollständig aus. Nehmen Sie die Tropfen nach Möglichkeit vor den Mahlzeiten ein.

### **Dauer der Anwendung**

Bei Anwendung über mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte kontrolliert werden. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Gallenstropfen comp EKF eingenommen haben, als Sie sollten**

Gesundheitsschäden nach Überdosierung sind bisher keine bekannt geworden. Dennoch sollten Sie die Anordnungen Ihres Arztes oder Apothekers, bzw. die Dosierungsanleitungen in dieser Gebrauchsinformation unbedingt befolgen.

### **Wenn Sie die Einnahme von Gallenstropfen comp EKF vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **Wenn Sie die Einnahme von Gallenstropfen comp EKF abbrechen**

Sie können die Einnahme zu jeder Zeit unterbrechen oder beenden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

sehr häufig	mehr als 1 Behandler von 10
häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
sehr selten	weniger als 1 Behandler von 10.000
nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten sind während der Behandlung mit Schöllkraut-Präparaten Anstiege der Leberfunktionswerte (Transaminasen) und des Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildeten.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Gallenstentropfen comp EKF aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bei allen Präparaten aus Naturstoffen können bei der Lagerung Trübungen auftreten. Diese haben keinen Einfluss auf die Wirkung.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Gallenstentropfen comp EKF enthalten:**

In 10 ml (entsprechend 9,00 g) Mischung sind folgende Wirkstoffe verarbeitet:

Berberis vulgaris Dil. D3	2,0 ml
Chelidonium majus Dil. D4	2,0 ml
Cholesterinum Dil. D3	2,0 ml
Lycopodium clavatum Dil. D20	2,0 ml
- Der sonstige Bestandteil ist:	
Ethanol 43 %	2,0 ml

1 ml Mischung entspricht 41 Tropfen.

### **Wie Gallenstentropfen comp EKF aussehen und Inhalt der Packung**

Aussehen: gelbe Flüssigkeit in einer Flasche aus Braunglas mit Schraubverschluss aus weißem Kunststoff und Tropfeinsatz aus transparentem Kunststoff

Packung: Originalpackungen mit 50 ml (N1) und 100 ml (N2) Mischung

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Marien-Apotheke

Inhaber Dr. Clemens Reuther e.K.

Marktplatz 10

83209 Prien am Chiemsee

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2020.**