Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Boehringer Ingelheim

Ginsana® G115 Kapseln
100 mg pro Weichkapsel

Wirkstoff: Trockenextrakt aus Ginsengwurzeln

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen GINSANA G115 Kapseln vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser Packungsbeilage:

1. Was sind GINSANA G115 Kapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von GINSANA G115 Kapseln beachten?
3. Wie sind GINSANA G115 Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind GINSANA G115 Kapseln aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND GINSANA G115 KAPSELN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

GINSANA G115 Kapseln sind ein pflanzliches Stärkungsmittel.

GINSANA G115 Kapseln werden angewendet zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl, nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

Hinweis: Wenn Schwächegefühl, Müdigkeit oder Leistungs- und Konzentrationsstörungen länger andauern, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Untersuchung bedürfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON GINSANA G115 KAPSELN BEACHTEN?

GINSANA G115 Kapseln dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile des Trockenextraktes aus Ginsengwurzeln oder einen der sonstigen Bestandteile von GINSANA G115 Kapseln sind.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Besondere Vorsicht bei der Einnahme von GINSANA G115 Kapseln ist erforderlich:

Kinder
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Geben Sie GINSANA G115 Kapseln deshalb Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

Einnahme von GINSANA G115 Kapseln zusammen mit anderen Arzneimitteln

In einer Studie mit Amerikanischem Ginseng wurde gezeigt, dass Ginseng die Wirkung von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulanzien) verringern kann. Bevor Sie dieses Präparat einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob Sie solche Arzneimittel einnehmen oder in naher Zukunft einnehmen müssen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollten GINSANA G115 Kapseln in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von GINSANA G115 Kapseln

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie GINSANA G115 Kapseln daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.
Sojaöl kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

3. WIE SIND GINSANA G115 KAPSELN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie GINSANA G115 Kapseln immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, werden täglich 2 Weichkapseln eingenommen, ggf. kann auf 4 Weichkapseln erhöht werden. Nehmen Sie die Weichkapseln bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise mit einem Glas Trinkwasser).

Art und Dauer der Anwendung

GINSANA G115 Kapseln sind zum Einnehmen. In der Regel soll die Anwendungsdauer bis zu 3 Monaten betragen. Eine erneute Einnahme ist möglich.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von GINSANA G115 Kapseln zu stark oder zu schwach ist.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Wenn Sie eine größere Menge GINSANA G115 Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge GINSANA G115 Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten, können die als Nebenwirkungen bekannten Symptome Magenbeschwerden und Übelkeit verstärkt werden. Zur Entscheidung, ob Gegenmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie die Einnahme von GINSANA G115 Kapseln vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann GINSANA G115 Kapseln Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

In seltenen Fällen können leichte und vorübergehende Magen-Darm-Beschwerden, (z. B. Übelkeit, Magenschmerzen, Durchfall) und Schlaflosigkeit auftreten. Außerdem wurde in seltenen Fällen vom Auftreten allergischer Reaktionen berichtet.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND GINSANA G115 KAPSELN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Blister angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 ºC lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was GINSANA G115 Kapseln enthalten

Der Wirkstoff ist:

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
Trockenextrakt aus Ginsengwurzeln.

1 Weichkapsel enthält 100 mg Trockenextrakt aus Ginsengwurzeln (3-7:1), Auszugsmittel: Ethanol 40 Vol.-%.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Lactose-Monohydrat, Hochdisperses Siliciumdioxid, Entölte Phospholipide aus Sojabohnen, gelbes Wachs, hydriertes und partiell hydriertes Sojaöl, Rapsöl, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzylaldehyd, Gelatine, Glycerol 85%, Eisen(II, III)-oxid E 172, Eisen(III)-oxid E 172, D-Mannitol - D-Glucitol - Sorbitan - höhere Polyole - Gemisch.

Hinweis für Diabetiker: 1 Weichkapsel enthält weniger als 0,019 BE.

Wie GINSANA G115 Kapseln aussehen und Inhalt der Packung

GINSANA G115 Kapseln sind in Packungen mit 30 und 60 Weichkapseln erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Telefon: 0 800/77 90 900
Telefax: 0 61 32/72 99 99

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [Monat / Jahr].

Weitere Darreichungsformen:
GINSANA® G115 Tonic 250 ml (N1) und 2 x 250 ml (N2)