

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Gluti-Agil® mono, 200 mg Glutaminsäure, überzogene Tabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahre

Wirkstoff: Glutaminsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Gluti-Agil® mono jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Gluti-Agil® mono und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Gluti-Agil® mono beachten?
3. Wie ist Gluti-Agil® mono einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gluti-Agil® mono aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST GLUTI-AGIL® MONO UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Gluti-Agil® mono ist ein traditionell angewendetes Arzneimittel zur Besserung des Allgemeinbefindens.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Bei Auftreten von Krankheitszeichen oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME/ANWENDUNG VON GLUTI-AGIL® MONO BEACHTEN?

Gluti-Agil® mono darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Glutaminsäure oder einen der sonstigen Bestandteile von Gluti-Agil® mono sind.

Gluti-Agil® mono soll nicht angewendet werden bei schweren pathologischen (krankhaften) Trieb- und Affektsteigerungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Gluti-Agil® mono ist erforderlich:

Bei Einnahme von Gluti-Agil® mono mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Gluti-Agil® mono zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Während der Einnahme von Gluti-Agil® mono sollten Sie, zur Vermeidung des sogenannten China-Food-Syndroms, eine häufige Einnahme von chinesischen Speisen vermeiden.

Was ist bei Kindern zu beachten?

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen wird die Einnahme von Gluti-Agil® mono bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Bei der Anwendung von Glutaminsäure als Arzneimittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben. Dennoch wird wegen der ungenügenden Untersuchungen die Einnahme von Gluti-Agil® mono in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Keine bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Gluti-Agil® mono

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Saccharose). Bitte nehmen Sie Gluti-Agil® mono erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST GLUTI-AGIL® MONO EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Gluti-Agil® mono immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr nehmen 3 x täglich 2 - 4 überzogene Tabletten.

Wie und wann sollten Sie Gluti-Agil® mono einnehmen?

Gluti-Agil® mono überzogene Tabletten werden jeweils nach den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit Flüssigkeit (ca. ½ Glas) eingenommen. Gluti-Agil® mono sollte aufgrund eines eventuell anregenden Effektes mindestens 3 Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Gluti-Agil® mono einnehmen?

Die Dauer der Einnahme von Gluti-Agil® mono ist prinzipiell nicht begrenzt. Beachten Sie jedoch bitte die Angaben unter "Anwendungsgebiete".

Wenn Sie eine größere Menge Gluti-Agil® mono eingenommen haben, als Sie sollten

Bei einer Überdosierung ist, abhängig von der eingenommenen Anzahl der überzogenen Tabletten mit einem Zustand erhöhter Anregung und Störungen beim Ein- und Durchschlafen zu rechnen. Falls ein derartiger Zustand auftritt, vermeiden Sie es bitte, selbst Auto zu fahren und suchen in Begleitung Ihren Arzt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Gluti-Agil® mono vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Beginnen Sie nach der nächsten Mahlzeit erneut mit der Einnahme.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Gluti-Agil® mono Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei hohen Dosierungen können motorische Unruhe (Bewegungsdrang) und Schlafstörungen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Informieren Sie baldmöglichst Ihren Arzt, der aufgrund der Schwere der Nebenwirkungen entscheiden wird, ob die Behandlung eventuell mit reduzierter Dosierung fortgesetzt wird oder nicht.

5. WIE IST GLUTI-AGIL® MONO AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Wann ist Gluti-Agil® mono vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendbar?

Verwenden Sie Gluti-Agil® mono nicht mehr, wenn die überzogenen Tabletten geplatzt oder zerbrochen sind.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 20°C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Gluti-Agil® mono enthält:

Wirkstoff: 1 überzogene Tablette enthält 200 mg Glutaminsäure.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Stearinsäure, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Talkum, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph. Eur.), Schellack, weißer Ton, Arabisches Gummi, Tragant, Montanglycolwachs, Titandioxid (E171), Maisstärke, Gelatine, Cellulosepulver, Hochdisperses Siliciumdioxid, Rizinusöl, Sucrose (Saccharose).

Wie Gluti-Agil® mono aussieht und Inhalt der Packung:

Gluti-Agil® mono sind weiße überzogene Tabletten zum Einnehmen.

OP mit 50 überzogenen Tabletten,
OP mit 100 überzogenen Tabletten,
OP mit 200 überzogenen Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer

Abanta Pharma GmbH
Reichsstraße 78
58840 Plettenberg

Telefon: +49 341 2582 190

Telefax: +49 341 2582 191

E-Mail: info@abanta-pharma.de

Hersteller

RIEMSER Pharma GmbH
An der Wiek 7
17493 Greifswald - Insel Riems
phone +49 38351 76-0
fax +49 38351 308
e-mail info@RIEMSER.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2017.