

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Glycerin Winthrop**

1,5 g Glycerol pro Zäpfchen

Wirkstoff: Glycerol 85 %

Für Schulkinder und Erwachsene

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Glycerin Winthrop jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Glycerin Winthrop, und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Glycerin Winthrop beachten?
3. Wie ist Glycerin Winthrop anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Glycerin Winthrop aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Glycerin Winthrop, und wofür wird es angewendet?**

Glycerin Winthrop ist ein Abführmittel.

#### **Glycerin Winthrop wird angewendet:**

- bei Verstopfung sowie zur Darmentleerung vor rektalen Untersuchungen (Rektoskopie),
- zur Erweichung des Stuhls bei Hämorrhoiden und Analfissuren.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Glycerin Winthrop beachten?**

#### **Glycerin Winthrop darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Glycerol oder einem der sonstigen Bestandteile von Glycerin Winthrop sind,
- bei Vorliegen von Darmverschluss (Ileus) und unklaren Bauchschmerzen.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei der Anwendung von Glycerin Winthrop kann es wegen des Hilfsstoffes Hartfett bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit solcher Kondome kommen.

### **Bei Anwendung von Glycerin Winthrop mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Aufnahme anderer Arzneistoffe, die im gleichen Zeitraum rektal angewendet werden, kann durch Glycerin Winthrop vermindert werden. Wenden Sie daher andere Zäpfchen oder Klistiere zeitlich versetzt an.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Berichte über schädliche Wirkungen der rektalen Anwendung von Glycerol während der Schwangerschaft und Stillzeit sind nicht bekannt.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## **3. Wie ist Glycerin Winthrop anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Soweit nicht anders verordnet, wird bei Bedarf 1- bis 2-mal täglich etwa 20 bis 30 Minuten vor der beabsichtigten Entleerung 1 Zäpfchen in den After eingeführt.

Hinweis: Eine feuchte und glänzende Oberfläche der Zäpfchen beeinflusst die Qualität und Wirksamkeit des Arzneimittels nicht.

### **Art der Anwendung**

Zum Einführen in den After (rektale Anwendung).

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Glycerin Winthrop zu stark oder zu schwach ist.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Glycerin Winthrop angewendet haben, als Sie sollten**

Es kann zu verstärktem Stuhldrang bis zu Durchfall und ggf. zu Reizerscheinungen im Analbereich kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Sehr selten (betrifft weniger als 1 Behandelten von 10.000) kann es bei besonders empfindlichen Personen oder bei vorgeschädigter Schleimhaut zu Reizungen der Enddarmschleimhaut kommen.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Glycerin Winthrop aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Blister nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 25 °C lagern.

### **6. Weitere Informationen**

#### **Was Glycerin Winthrop enthält:**

Der Wirkstoff ist Glycerol 85 %.  
1 Zäpfchen enthält 1,5 g Glycerol 85 %.

Sonstige Bestandteile: Hartfett; leichtes, basisches Magnesiumcarbonat.

#### **Wie Glycerin Winthrop aussieht und Inhalt der Packung:**

Torpedoförmige, weiße Zäpfchen.  
Blisterpackung mit 10 Zäpfchen.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  
65926 Frankfurt am Main  
Postanschrift:  
Postfach 80 08 60  
65908 Frankfurt am Main  
Telefon: 0800 56 56 010  
Telefax: 0800 56 56 011

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im **September 2018**.

---

**Apothekenpflichtig.**