

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Harnsäuretropfen F Syxyl

Wirkstoffe:

Berberis vulgaris Dil. D6

Colchicum autumnale Dil. D6

Mischung flüssiger Verdünnungen

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen **Harnsäuretropfen F Syxyl** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was sind **Harnsäuretropfen F Syxyl** und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Harnsäuretropfen F Syxyl** beachten?
3. Wie sind **Harnsäuretropfen F Syxyl** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind **Harnsäuretropfen F Syxyl** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND HARNSÄURETROPFEN F SYXYL UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Harnsäuretropfen F Syxyl sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Harnsäuretropfen F Syxyl werden entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet.

Dazu gehört: Behandlung von Gicht und Rheuma.

Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HARNSÄURETROPFEN F SYXYL BEACHTEN?

Harnsäuretropfen F Syxyl dürfen nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Berberis vulgaris, Colchicum autumnale oder einen der sonstigen Bestandteile von **Harnsäuretropfen F Syxyl** sind.
- wenn Sie alkoholkrank sind.

Wegen des Alkoholgehaltes sollen **Harnsäuretropfen F Syxyl** bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Harnsäuretropfen F Syxyl ist erforderlich
Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Die Anwendung bei Jugendlichen ab 12 bis unter 18 Jahren sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Harnsäuretropfen F Syxyl zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

sind keine Besonderheiten zu beachten.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit sind **Harnsäuretropfen F Syxyl** nicht anzuwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Harnsäuretropfen F Syxyl

Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST HARNSÄURETROPFEN F SYXYL EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie **Harnsäuretropfen F Syxyl** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3-mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Harnsäuretropfen F Syxyl** zu stark oder zu schwach ist.

Wie lange sollten Sie Harnsäuretropfen F Syxyl einnehmen?

Allgemeiner Hinweis:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Harnsäuretropfen F Syxyl eingenommen haben, als Sie sollten

Über akute Vergiftungen durch **Harnsäuretropfen F Syxyl** ist beim Menschen bisher nicht berichtet worden. Setzen Sie bitte die Behandlung beim nächsten Einnahmezeitpunkt mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie die Einnahme von Harnsäuretropfen F Syxyl vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern setzen Sie die Einnahme von **Harnsäuretropfen F Syxyl** mit der üblichen Dosis fort.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können **Harnsäuretropfen F Syxyl** Nebenwirkungen haben.

Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger- Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND HARNSÄURETROPFEN F SYXYL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Bitte bewahren Sie **Harnsäuretropfen F Syxyl** stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses:

Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeit.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Zusammensetzung

10,0 g enthalten:

Wirkstoffe:

Berberis vulgaris Dil. D6 5,00 g

Colchicum autumnale Dil. D6 5,00 g

1 g entspricht 33 Tropfen
(10 ml entsprechen 9,28 g)

Harnsäuretropfen F Syxyl sind in der Originalpackung zu 50 ml und 100 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Syxyl GmbH & Co.KG, Gereonsmühlengasse 5, 50670 Köln

Telefon: 0800/1652400, Telefax: 0800/1652700

E-Mail: dialog@syxyl-service.de

Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Straße 41, 12277 Berlin

[Johannes Bürger Ysartfabrik GmbH, Herzog-Julius-Straße 83, 38667 Bad Harzburg]

Stand der Information

Juli 2018