

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Hexaquant S Lösung**

#### **Didecyldimethylammoniumchlorid 3,0% und Benzalkoniumchlorid 7,6%**

#### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Hexaquant S jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 bis 4 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Hexaquant S und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hexaquant S beachten?
3. Wie ist Hexaquant S anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hexaquant S aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST HEXAQUANT S UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Hexaquant S ist ein Desinfektionsmittel mit quartären Ammonium-Verbindungen zur Unterstützung allgemeinhygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz.

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON HEXAQUANT S BEACHTEN?**

##### **Hexaquant S darf nicht angewendet werden,**

- Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen quartäre Ammoniumverbindungen oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe.
- Auf geschädigter Haut.
- Beim Auftreten von Hautreizungen ist die Anwendung von Hexaquant S zu unterlassen.

##### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Hexaquant S ist erforderlich,**

- Hexaquant S ist ein Konzentrat und muss vor Gebrauch immer verdünnt werden!
- Unverdünntes Hexaquant S verursacht Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
- Bei der Arbeit mit dem Konzentrat geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hexaquant S soll nur äußerlich angewendet werden. Bei versehentlicher Einnahme unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

## **Bei Anwendung von Hexaquant S mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

### **3. WIE IST HEXAQUART S ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel entsprechend der nachfolgenden Dosierungsempfehlungen an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

***Hexaquant S ist ein Konzentrat und muss vor Gebrauch verdünnt werden!***

Auf der Haut im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz wird Hexaquant S in einer Konzentration von 0,5% angewendet.

Zur Herstellung von z.B. 1 Liter gebrauchsfertiger Verdünnung werden mit Hilfe eines Messbechers 5 ml Konzentrat mit 995 ml Wasser verdünnt.

***Wann wird Hexaquant S angewendet?***

- Nach der Benutzung von Nassbereichen in Gemeinschaftseinrichtungen.
- Bei bestehender Fusspilzerkrankung sollten Sie nach Möglichkeit Nassbereiche in Gemeinschaftseinrichtungen bis zum Abklingen der Krankheit meiden. Ist dies nicht möglich, so sind vor und nach Benutzung des Nassbereichs die Füße mit Hexaquant S zu desinfizieren.

***Anwendung***

- Hexaquant S (0,5 % Verdünnung) auf Füße und ggf. Badeschuhe satt aufsprühen oder mit getränktem Tuch auftragen.
- Die betroffenen Hautareale müssen vollständig mit der Desinfektionsmittellösung benetzt sein.
- Lösung auf der Haut trocknen lassen.

Ein Aufkleber für die Information der Benutzer von Fußsprühanlagen wird den Betreibern derartiger Anlagen auf Anforderung kostenlos zur Verfügung gestellt.

***Hinweis:***

Eine Wirksamkeit gegenüber Papovaviren wird im Suspensionsversuch mit einer 1 %igen Lösung nach 5 Minuten erreicht.

***Überdosierung***

Wenn versehentlich eine zu hohe Konzentration oder unverdünntes Hexaquant S angewendet wurden, Haut mit viel Wasser abwaschen.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Hexaquant S Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Örtliche Hautreizungen und Kontaktallergien können vorkommen. In diesem Fall darf Hexaquant S nicht mehr angewendet werden und es sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. WIE IST HEXAQUART S AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Konzentrat ist wassergefährdend. Beim Freiwerden größerer Mengen (z. B. bei Unfällen oder Unregelmäßigkeiten) das Konzentrat nicht in die öffentliche Kanalisation, Oberflächen- / Grundwasser gelangen lassen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Umweltbeeinträchtigungen zu erwarten.

Das Arzneimittel soll nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Hexaquart S enthält

- Wirkstoffe: 100 g ( $\hat{=}$  101 ml) Lösung enthalten 3,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid und 7,6 g Benzalkoniumchlorid.
- Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, 2-Propanol (Ph. Eur.), Nonoxinol 9.

### Wie Hexaquart S aussieht und Inhalt der Packung

Klare, farblose Lösung in Behältnissen zu 1000 ml, 5 l und 25 l

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

B. Braun Melsungen AG  
Carl-Braun-Str. 1  
34212 Melsungen  
Telefon: 05661-710  
Telefax: 05661-71 4567

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 07/2015.**

---

### Hexaquart S ist auch zur Desinfektion und Reinigung von abwaschbaren Flächen und Gebrauchsgegenständen geeignet:

Anwendungsgebiet	Konzentration	EZ	Menge*
Flächendesinfektion und Reinigung in patientenbezogenen Sanitärbereichen des Krankenhauses und zur Hospitalismusprophylaxe sowie in der allgemeinen Praxis gemäß VAH-Liste	2,5 %	30 min	25 ml
	1,5 %	1 h	15 ml
	1,0 %	4 h	10 ml
Desinfektion von Schuhen und Strümpfen: – Strümpfe 1 h in die verdünnte Lösung einlegen, anschließend gut ausspülen. – Schuhe besprühen und 1 h einwirken lassen.	3 %	1h	30 ml
Behandlung von Flächen in Bädereichen und Schwimmbädern	0,5 % - 1 %		5-10 ml

\*: für 1000 ml Gebrauchslösung

Bei bestehendem Verdacht auf eine Allergisierung durch Hexaquant S sind die einzelnen Inhaltsstoffe des Produktes in dermatologisch sinnvoller Verdünnung vom Hersteller zur epicutanen Austestung beziehbar.