

Zukünftiger Wortlaut der für die Packungsbeilage (§ 11 AMG)

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Hypericum Steierl Potenzakkord jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Hypericum Steierl Potenzakkord und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Hypericum Steierl Potenzakkord beachten?
3. Wie ist Hypericum Steierl Potenzakkord einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hypericum Steierl Potenzakkord aufzubewahren?

Hypericum Steierl Potenzakkord Mischung

Wirkstoffe:

Hypericum perforatum Ø,
Hypericum perforatum Dil. D6 und
Hypericum perforatum Dil. D12.

Zusammensetzung:

10,0 g enthalten:

Wirkstoffe:

Hypericum perforatum Ø	3,34 g
Hypericum perforatum Dil. D6	3,33 g
Hypericum perforatum Dil. D12	3,33 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Es sind keine sonstigen Bestandteile vorhanden.

(10 ml entsprechen 9,16 g)

1 ml entspricht 33 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

Hypericum Steierl Potenzakkord ist in der Packung mit 50 ml Mischung erhältlich.

1. WAS IST HYPERICUM STEIERL POTENZAKKORD UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

1.1 Hypericum Steierl Potenzakkord ist ein homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen.

1.2 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Steierl-Pharma GmbH,
Mühlfelder Straße 48,
82211 Herrsching
Telefon: 08152/9322-0, Telefax: 08152/9322-49
E-Mail: info@steierl.de Internet: www.steierl.de

1.3 Hypericum Steierl Potenzakkord wird entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild angewendet.

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild.
Dazu gehören: Verstimmungszustände

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HYPERICUM STEIERL POTENZAKKORD BEACHTEN?

2.1 Hypericum Steierl Potenzakkord darf nicht eingenommen werden, wenn Sie gleichzeitig auch mit einem anderen Arzneimittel behandelt werden, welches einen Arzneistoff aus einer der unter Abschnitt 2.3 aufgeführten Stoffgruppen enthält:

Außerdem darf Hypericum Steierl Potenzakkord nicht angewendet werden

- bei bekannter Allergie gegen einen seiner Bestandteile
- bei bekannter Lichtüberempfindlichkeit der Haut
- von gebärfähigen Frauen, die keine Verhütungsmaßnahmen treffen

Hypericum Steierl Potenzakkord ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Das Arzneimittel darf wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

2.2. Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Hypericum Steierl Potenzakkord ist erforderlich

Dieses Arzneimittel enthält 57 Vol-% Alkohol.

Arzneimittel, die wie Hypericum Steierl Potenzakkord Bestandteile aus Johanniskraut (Hypericum) enthalten, können mit anderen Arzneistoffen in Wechselwirkung treten:

Wirkstoffe aus Hypericum können die Ausscheidung anderer Arzneistoffe beschleunigen und dadurch die Wirksamkeit dieser anderen Stoffe herabsetzen. Wirkstoffe aus Hypericum können aber auch die Konzentration eines sog. ‚Botenstoffes‘ (des Serotonins) im Gehirn heraufsetzen, so dass dieser Stoff unter Umständen gefährliche Wirkungen entfalten kann, insbesondere bei Kombination mit anderen gegen Depression wirkenden Medikamenten. Sie sollten, falls Sie bereits Hypericum Steierl Potenzakkord anwenden, hierüber Ihren Arzt informieren, wenn er Ihnen ein weiteres Medikament verordnet oder wenn Sie selbst ein in der Apotheke erhältliches verschreibungsfreies anderes Arzneimittel zusätzlich einnehmen wollen. In diesen Fällen ist zu erwägen, die Behandlung mit Hypericum Steierl Potenzakkord zu beenden.

Sofern eine gleichzeitige Anwendung von Hypericum Steierl Potenzakkord mit anderen Arzneimitteln für erforderlich gehalten wird, muss Ihr Arzt die möglichen Wechselwirkungen bedenken:

Wirkungsverminderung von

- Theophyllin
- Digoxin
- Verapamil
- Simvastatin
- Midazolam
- Ivabradin

Wirkungsverstärkung von andersartigen Mitteln gegen Depression wie

- Paroxetin
- Sertralin
- Trazodon.

Eine gleichzeitige Anwendung von Hypericum Steierl Potenzakkord sollte nur nach sorgfältiger Nutzen/Risiko-Abwägung wegen des möglichen Auftretens eines Serotoninsyndroms mit Übelkeit, Erbrechen, Angst, Ruhelosigkeit oder Verwirrtheit erfolgen.

Während der Anwendung von Hypericum Steierl Potenzakkord soll eine intensive UV-Bestrahlung (lange Sonnenbäder, Höhensonne, Solarien) vermieden werden.

Falls Ihre Leberfunktion eingeschränkt ist bzw. Sie erhöhte Leberwerte haben, nehmen Sie Hypericum Steierl Potenzakkord nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Hypericum Steierl Potenzakkord bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder vor kurzem eingenommen haben.

Hypericum Steierl Potenzakkord kann mit zahlreichen anderen Arzneistoffen in dem Sinne in Wechselwirkung treten, dass die Konzentration dieser Stoffe im Blut gesenkt wird und dadurch ihre Wirksamkeit abgeschwächt ist. Zu diesen Stoffen gehören folgende Arzneistoffe:

- Arzneimittel zur Unterdrückung von Abstoßungsreaktionen gegenüber Transplantaten
 - Ciclosporin
 - Tacrolimus zur innerlichen Anwendung
 - Sirolimus
- Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen oder AIDS-Proteinase-Hemmer wie - Indinavir
- Non-Nucleosid Reverse-Transcriptase-Hemmer wie
 - Nevirapin
- Zytostatika wie
 - Imatinib

- Irinotecan
mit Ausnahme von monoklonalen Antikörpern
- Arzneimittel zur Hemmung der Blutgerinnung
- Phenprocoumon
- Warfarin
- Theophyllin
- Digoxin
- Verapamil
- Simvastatin
- Midazolam
- Ivabradin
- Hormonelle Empfängnisverhütungsmittel und
- andersartige Mittel gegen Depression wie
- Amitriptylin und
- Nortriptylin.

Hypericum Steierl Potenzakkord kann mit anderen Arzneimitteln zur Depressionsbehandlung die Konzentration von Serotonin im Gehirn so weit heraufsetzen, dass es dadurch unter Umständen zu einem lebensbedrohlichen sogenannten Serotoninsyndrom kommt. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Arzneistoffe:

- Paroxetin
- Sertralin und
- Trazodon.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit anderen Arzneimitteln, die photosensibilisierend wirken, ist eine Verstärkung phototoxischer Wirkungen möglich (siehe Abschnitt 4.1 Nebenwirkungen).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Johanniskraut-haltige Arzneimittel auch die Verstoffwechslung weiterer Arzneimittel beeinflussen. Daraus kann sich für die betroffenen Arzneimittel eine verminderte und/oder verkürzte Wirkung ergeben. Bitte informieren Sie deshalb Ihren Arzt, falls Sie andere Arzneimittel einnehmen oder bis vor kurzem eingenommen haben.

2.4 Bei Einnahme von Hypericum Steierl Potenzakkord zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

3. WIE IST HYPERICUM STEIERL POTENZAKKORD EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Hypericum Steierl Potenzakkord immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Erwachsene:

1 – 3 mal täglich 5 – 10 Tropfen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Hypericum Steierl Potenzakkord zu stark oder zu schwach ist.

Wie lange sollten Sie Hypericum Steierl Potenzakkord einnehmen?

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

3.3 Wenn Sie die Einnahme von Hypericum Steierl Potenzakkord vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern setzen Sie die Einnahme von Hypericum Steierl Potenzakkord wie verordnet fort.

Wenn Sie eine größere Menge von Hypericum Steierl Potenzakkord eingenommen haben, als Sie sollten:

Benachrichtigen Sie Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf. Bei der Einnahme erheblicher Überdosen sollten die betroffenen Patienten umgehend für die Dauer von 1-2 Wochen vor Sonnenlicht und sonstiger UV-Bestrahlung geschützt werden (Aufenthalt im Freien einschränken, Sonnenschutz durch bedeckende Kleidung und Verwendung von Sonnenschutzmitteln mit hohem Lichtschutzfaktor, sog. „Sonnenblockern“).

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Hypericum Steierl Potenzakkord Nebenwirkungen haben.

4.1 Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Hypericum Steierl Potenzakkord kann es vor allem bei hellhäutigen Personen durch erhöhte Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Licht (Photosensibilisierung) zu sonnenbrandähnlichen Reaktionen der Hautpartien kommen, die starker Bestrahlung (Sonne, Solarium) ausgesetzt sind. Außerdem können unter der Medikation mit Hypericum Steierl Potenzakkord vermehrt allergische Hautausschläge, Magen-Darm-Beschwerden, Müdigkeit oder Unruhe, subjektive Missempfindungen wie z.B. Kribbeln und Erhöhungen der Leberwerte auftreten.

Allgemeiner Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

4.2 Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu treffen?

Sollten Sie die oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, benachrichtigen Sie Ihren Arzt. Er wird über den Schweregrad und gegebenenfalls über erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden. Meiden Sie im Falle sonnenbrandähnlicher Hautreaktionen Sonnenbestrahlung bzw. UV-Bestrahlung. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. WIE IST HYPERICUM STEIERL POTENZAKKORD AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeit.

Nicht über 30°C aufbewahren

Stand der Information

November 2010