

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender
Imex®
30 mg pro 1 g Salbe, Salbe
Wirkstoff: Tetracyclinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Imex® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Imex® beachten?
3. Wie ist Imex® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Imex® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST IMEX® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Imex® ist ein Antibiotikum zur äußerlichen Anwendung.

Imex® wird angewendet bei allen Formen der Akne, insbesondere bei entzündlichen Formen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON IMEX® BEACHTEN?

Imex® darf nicht angewendet werden,
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Tetracyclinhydrochlorid oder einen der sonstigen Bestandteile von Imex® sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Imex® ist erforderlich:
Geben Sie Imex® Kindern nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher nur begrenzte Erfahrungen für die Anwendung bei Kindern vorliegen.

Bei /Anwendung von Imex® mit anderen Arzneimitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Obwohl kein Hinweis auf eine fruchtschädigende Wirkung besteht, sollten Sie Imex® während der Schwangerschaft nur nach ausdrücklicher Anweisung des Arztes anwenden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE IST IMEX® ANZUWENDEN?

Wenden Sie Imex® immer genau nach der Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
1 – 3 mal täglich auf die zu behandelnden Hautstellen auftragen und leicht einmassieren.

Art der Anwendung:
Anwendung auf der Haut

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Imex® zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie die Anwendung von Imex® vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Imex® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Erkrankungen der Haut

Selten: juckendes und brennendes Hautempfinden, Rötung der Haut, trockene Haut

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST IMEX® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen :

Nicht über 25°C lagern

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Imex® enthält:

Der Wirkstoff ist Tetracyclinhydrochlorid.

1 g Salbe enthält 30 mg Tetracyclinhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Weißes Vaseline, mittelkettige Triglyceride, Titandioxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid, braun, Eisen(III)-hydroxid-oxid, rot

Wie Imex® aussieht und Inhalt der Packung:

Imex® ist eine hautfarbene Salbe und ist in Packungen mit 20 g Salbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt

Telefon: 069/1503-1

Telefax: 069/1503-200

Hersteller

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt

Telefon: 069/1503-1

Telefax: 069/1503-200

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 03/2008