

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Kerato Bicion® 5%

Augensalbe

Calciumpantothenat

Zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Haut- und Schleimhautläsionen am Auge.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Kerato Bicion® 5% jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Kerato Bicion® 5% und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Kerato Bicion® 5% beachten?
3. Wie ist Kerato Bicion® 5% anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Kerato Bicion® 5% aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Kerato Bicion® 5% und wofür wird es angewendet?

Kerato Bicion® 5% ist ein Arzneimittel zur schnellen Wiederherstellung der geschädigten oder verletzten Hornhaut des Auges. Es dient zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Haut- und Schleimhautläsionen am Auge.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Kerato Bicion® 5% beachten?

Kerato Bicion® 5% darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Calciumpantothenat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Kerato Bicion® 5% anwenden. Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Kerato Bicion® 5% sind nicht erforderlich.

Ob während der Therapie mit Kerato Bicion® 5% Kontaktlinsen getragen werden dürfen, entscheidet der behandelnde Arzt.

Kontaktlinsen sollten frühestens 10-15 Minuten nach Anwendung von Kerato Bicion® 5% eingesetzt werden.

Anwendung von Kerato Bicion® 5% zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie können Kerato Bicion® 5% nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch infolge des Salbenfilms kurzzeitig die Sehschärfe und somit das Reaktionsvermögen beeinflussen.

Verzichten Sie solange darauf Fahrzeuge zu lenken, Maschinen zu bedienen oder Arbeiten ohne sicheren Halt zu verrichten.


Kerato Bicion® 5% enthält Wollwachs

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen.

3. Wie ist Kerato Bicion® 5% anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Von Kerato Bicion® 5% soll jeweils ein etwa 1 cm langer Salbenstrang auf den inneren Rand des herabgezogenen Unterlides aufgetragen werden. Durch mehrmalige Lid- und Augenbewegungen wird die Salbe verteilt.



Falls vom Arzt nicht anders verordnet soll, von Kerato Bicion® 5% ein- bis mehrmals täglich ein etwa 1 cm langer Salbenstrang in das Auge eingestrichen werden.

Die Anwendungsdauer bestimmt der behandelnde Arzt entsprechend der Schwere des Krankheitsbildes und dem Verlauf der Erkrankung. Kerato Bicion® 5% kann ohne Bedenken langfristige angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Kerato Bicion[®] 5% zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Kerato Bicion[®] 5% angewendet haben, als Sie sollten
Es sind keine Überdosierungserscheinungen zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von Kerato Bicion[®] 5% vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Behandlung mit der vorgegebenen Dosierung fort.

Wenn Sie die Anwendung von Kerato Bicion[®] 5% abbrechen

Wenn Sie die Therapie mit Kerato Bicion[®] 5% abbrechen oder unterbrechen wollen, sprechen Sie bitte in jedem Fall zuerst mit Ihrem behandelnden Arzt darüber.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben von Nebenwirkungen werden üblicherweise folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Kerato Bicion[®] 5% nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf. In den sehr seltenen Fällen einer Überempfindlichkeit (z.B. allergische Reaktionen etc.) gegen Kerato Bicion[®] 5% ist von der weiteren Anwendung der Augensalbe Abstand zu nehmen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Webseite: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Kerato Bicion® 5% aufzubewahren?

Kerato Bicion® 5% nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch ist die Augensalbe nicht länger als 6 Wochen zu verwenden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Kerato Bicion® 5% enthält

Der Wirkstoff ist: Calciumpantothenat

1 g Salbe enthält 50 mg Calciumpantothenat.

Die sonstigen Bestandteile sind: Wollwachs, Paraffin dünnflüssig, Paraffin dickflüssig, Vaseline weiß.

Wie Kerato Bicion® 5% aussieht und Inhalt der Packung

Kerato Bicion® 5% ist eine gelblich weiße, schwach durchscheinende Salbe.

Kerato Bicion® 5% ist in Packungen zu 2,5 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

medphano Arzneimittel GmbH,

Maienbergstraße 10-12

15562 Rüdersdorf bei Berlin

Tel.: (033638) 749-0

Fax: (033638) 749-77

E-Mail: info@medphano.de

Hersteller:

S&K PHARMA Schumann und Kohl GmbH,

Maienbergstraße 10-12

15562 Rüdersdorf bei Berlin

Tel.: (033638) 749 38

Fax: (033638) 749 62

Kerato Bicion® 5% ist in der Bundesrepublik Deutschland unter der Nummer 6710612.00.00 zugelassen.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2018.

Eigenschaften

Kerato Bicion® 5% ist ein Arzneimittel zur schnellen Wiederherstellung der geschädigten oder verletzten Hornhaut des Auges. Kerato Bicion® 5% verbessert und beschleunigt die Wundheilung und sorgt für eine Wiederherstellung und normale Funktion des geschädigten Gewebes. Dadurch wird auch die Abwehrkraft der Hornhaut gegen Infektionen gestärkt.

850A0003