

Crataegus Ø	5,0 g	Mischung	auf 10,0 g
Camphora D2	5,0 g		
Stoff		Darreichungsform	Menge

## Anlage

### **Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben**

---

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

#### **KOROLINDA**

Wirkstoffe: Crataegus Ø und Camphora D2

Homöopathisches Arzneimittel bei Kreislaufbeschwerden

Mischung zum Einnehmen für Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss KOROLINDA jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist KOROLINDA und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von KOROLINDA beachten?
3. Wie ist KOROLINDA einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist KOROLINDA aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. Was ist KOROLINDA und wofür wird es angewendet?**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Kreislaufschwäche.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von KOROLINDA beachten?**

### **KOROLINDA darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Bestandteile sind,
- bei Alkoholkrankheiten,
- von Kindern unter 12 Jahren.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von KOROLINDA ist erforderlich**

Wegen des Alkoholgehaltes soll KOROLINDA bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Bei Einnahme von KOROLINDA mit anderen Arzneimitteln**

In der homöopathischen Literatur wird beschrieben, dass durch die vorangehende oder folgende Gabe von Kalium nitricum eine Beeinträchtigung der therapeutischen Wirkung von Camphora auftreten kann.

#### Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte KOROLINDA in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von KOROLINDA**

Dieses Arzneimittel enthält 61 Vol.-% Alkohol.

## **3. Wie ist KOROLINDA anzuwenden?**

Nehmen Sie KOROLINDA immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen ein.  
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Hinweis: Das Mittel muss auf Zucker oder Brot gegeben werden, da es in Wasser nicht löslich ist.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es können Magen-Darm-Beschwerden oder Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen z.B. Hautausschläge) auftreten.  
Diese Beschwerden klingen nach Absetzen des Arzneimittels innerhalb weniger Tage ab. Häufigkeit: Nicht bekannt

##### Allgemeiner Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist KOROLINDA aufzubewahren?**

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25°C lagern.

## **6. Weitere Informationen**

### **Was KOROLINDA enthält:**

10,0 g Mischung enthalten:

Wirkstoffe:

Crataegus Ø	5,0 g
Camphora D2	5,0 g

9,23 g entsprechen 10 ml, 1 g entspricht 28 Tropfen.

Enthält 61 Vol.-% Alkohol.

### **Wie KOROLINDA® aussieht und Inhalt der Packung:**

KOROLINDA ist eine klare, braune Flüssigkeit und in Flaschen zu 10 ml und 40 ml erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Robugen GmbH  
Pharmazeutische Fabrik  
Alleenstraße 22-26  
73730 Esslingen  
Tel.: 0711 / 136 30-0  
Fax: 0711 / 36 74 50  
Email: [info@robugen.de](mailto:info@robugen.de)

### **Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:**

Juni 2015