

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Korovit Kreislauf-Kapseln

Wirkstoff: D-Campher

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Korovit Kreislauf-Kapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Korovit Kreislauf-Kapseln beachten?
3. Wie sind Korovit Kreislauf-Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Korovit Kreislauf-Kapseln aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Korovit Kreislauf-Kapseln und wofür werden sie angewendet?

Korovit Kreislauf-Kapseln sind ein traditionelles Arzneimittel zum Einnehmen und werden traditionell angewendet zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Korovit Kreislauf-Kapseln beachten?

Korovit Kreislauf-Kapseln dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegenüber D-Campher, Ponceau 4R, Levomenthol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Korovit Kreislauf Kapseln einnehmen.

Hinweis

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufsuchen.

Kindern und Jugendliche

Zur Anwendung von Korovit Kreislauf-Kapseln bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Korovit Kreislauf-Kapseln zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen sollten Sie das Arzneimittel während Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Korovit Kreislauf-Kapseln enthält 16 mg Sorbitol pro Weichkapsel. Bitte wenden Sie Korovit Kreislauf-Kapseln erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Korovit Kreislauf-Kapseln enthält Ponceau 4R, das bei Personen, die gegen diesen Stoff besonders empfindlich sind, allergieartige Reaktionen hervorrufen kann.

3. Wie sind Korovit Kreislauf-Kapseln einzunehmen?

Nehmen Sie Korovit Kreislauf-Kapseln immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein, da Korovit Kreislauf-Kapseln sonst nicht richtig wirken können. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene nehmen 2 x täglich 1 Kapsel ein.

Die Kapseln werden zerbissen, der Inhalt im Mund verteilt und danach geschluckt. Nicht mit Wasser einnehmen.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist aufgrund der Indikation nicht vorgesehen.

Korovit Kreislauf-Kapseln können kurzzeitig im Bedarfsfall angewendet werden oder bei fortdauernden Beschwerden auch über einen längeren Zeitraum. Die Dauer der Anwendung bestimmt der Arzt. Bei Beschwerden unklarer Ursache sollte die Selbstmedikation nach 2 Wochen beendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Korovit Kreislauf-Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten

können Symptome einer Überdosierung auftreten, die sich z. B. in Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen äußern können. Suchen Sie dann bitte einen Arzt auf.

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme wie von Ihrem Arzt verordnet oder in dieser Packungsbeilage beschrieben fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Korovit Kreislauf-Kapseln Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Ponceau 4R kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Korovit Kreislauf-Kapseln aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Korovit Kreislauf-Kapseln enthalten:

Der Wirkstoff ist D-Campher.

1 Weichkapsel enthält 15,0 mg D-Campher.

Die sonstigen Bestandteile sind Raffiniertes Rapsöl, Gelatinepolysuccinat, Sorbitollösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph.Eur), Glycerol 85 %, Glycerol, Maisstärke, Pfefferminzöl (enthält Levomenthol), Vanillin, Acesulfam-Kalium (E 950), Ponceau 4R 80 %ig (E 124), Eisen(II,III)-oxid (E 172).

Wie Korovit Kreislauf-Kapseln aussehen und Inhalt der Packung:

Korovit Kreislauf-Kapseln sind rot und in Packungen mit 20, 50 und 100 Weichkapseln erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH

Pharmazeutische Fabrik

Alleenstraße 22

73730 Esslingen

Tel.: 0711 / 136 30-0

Fax: 0711 / 36 74 50

Email: info@robugen.de

Internet: www.robugen.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2018