

## Gebrauchsinformation: Information für Patienten

*Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten*  
*Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup> 100 mg Filmtabletten*  
*Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup> 150 mg Filmtabletten*  
*Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup> 200 mg Filmtabletten*

Lacosamid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* beachten?
3. Wie ist *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* und wofür wird es angewendet?

#### Was ist *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>*?

*Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* enthält Lacosamid. Diese Substanz gehört zur Arzneimittelgruppe der sogenannten Antiepileptika und wird zur Behandlung der Epilepsie eingesetzt.

Das Arzneimittel wurde Ihnen verordnet, um die Häufigkeit Ihrer Anfälle zu senken.

#### Wofür wird *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* angewendet?

- *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* wird bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 4 Jahren eingesetzt.
- Es wird zur Behandlung einer bestimmten Form von epileptischen Anfällen eingesetzt, die durch fokale Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung gekennzeichnet sind. Bei dieser Epilepsie-Form beginnt der Anfall in nur einer Gehirnhälfte, kann sich dann aber unter Umständen auf größere Bereiche in beiden Gehirnhälften ausbreiten.
- *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* kann alleine oder zusätzlich zu anderen Antiepileptika angewendet werden.

### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* beachten?

#### *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Lacosamid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie eine Allergie haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.
- wenn Sie unter bestimmten Herzrhythmusstörungen leiden (sog. AV-Block 2. oder 3. Grades).

Nehmen Sie *Lacosamid-ratiopharm<sup>®</sup>* nicht ein, wenn einer der genannten Punkte auf Sie zutrifft. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels mit Ihrem Arzt

oder Apotheker.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> einnehmen, wenn

- Sie Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid haben. Eine geringe Anzahl von Patienten, die mit Antiepileptika wie Lacosamid behandelt wurden, hatten Gedanken daran, sich selbst zu verletzen oder sich das Leben zu nehmen. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt solche Gedanken haben, setzen Sie sich **sofort** mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Sie eine Herzkrankheit haben, bei der der Herzschlag verändert ist und Sie oft einen sehr langsamen, schnellen oder unregelmäßigen Herzschlag haben (z. B. AV-Block, Vorhofflimmern oder Vorhofflattern).
- Sie eine schwerwiegende Herzkrankheit haben (z. B. Herzschwäche) oder schon einmal einen Herzinfarkt hatten.
- Ihnen häufig schwindelig ist oder Sie stürzen. *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> kann Schwindelgefühl verursachen und dadurch kann sich die Gefahr versehentlicher Verletzungen und Stürze erhöhen. Deshalb sollten Sie vorsichtig sein, bis Sie sich an die möglichen Wirkungen des Arzneimittels gewöhnt haben.

Wenn irgendeiner der genannten Punkte auf Sie zutrifft (oder Sie sich darüber nicht sicher sind), sprechen Sie vor der Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> einnehmen und Symptome eines ungewöhnlichen Herzschlags verspüren (wie langsamer, schneller oder unregelmäßiger Herzschlag, Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Schwindel, Ohnmacht), holen Sie unverzüglich medizinischen Rat ein (siehe Abschnitt 4).

### **Kinder unter 4 Jahren**

*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> wird nicht bei Kindern im Alter unter 4 Jahren empfohlen, weil man noch nicht weiß, ob es bei Kindern dieser Altersgruppe wirksam und sicher ist.

### **Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Sprechen Sie insbesondere mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen, die Auswirkungen auf die Herzfähigkeit haben können, denn auch *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> kann das Herz beeinflussen:

- Arzneimittel gegen Herzkrankheiten;
- Arzneimittel, die das sogenannte „PR-Intervall“ der Herzkurve im EKG (Elektrokardiogramm) verlängern können; beispielsweise Arzneimittel zur Behandlung der Epilepsie oder von Schmerzen wie Carbamazepin, Lamotrigin oder Pregabalin;
- Arzneimittel gegen bestimmte Arten von Herzrhythmusstörungen oder gegen Herzschwäche. Wenn irgendeiner der genannten Punkte auf Sie zutrifft (oder Sie sich darüber nicht sicher sind), sprechen Sie vor der Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen, denn diese können die Wirkung von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> im Körper verstärken oder abschwächen:

- Arzneimittel gegen Pilzinfektionen wie Fluconazol, Itraconazol oder Ketoconazol;
- ein Medikament gegen HIV wie Ritonavir;
- die Antibiotika Clarithromycin oder Rifampicin;
- das pflanzliche Arzneimittel Johanniskraut zur Behandlung leichter Angstzustände und Depressionen.

Wenn irgendeiner der genannten Punkte auf Sie zutrifft (oder Sie sich darüber nicht sicher sind), sprechen Sie vor der Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

### **Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> zusammen mit Alkohol**

Nehmen Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> vorsichtshalber NICHT zusammen mit Alkohol ein.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wird die Behandlung mit *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> nicht empfohlen, da nicht bekannt ist, welche Auswirkungen *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> auf den Verlauf der Schwangerschaft, auf das ungeborene Kind im Mutterleib oder auf das Neugeborene haben kann. Es ist auch nicht bekannt, ob *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> in die Muttermilch übergeht. Fragen Sie sofort Ihren Arzt um Rat, falls Sie schwanger geworden sind oder eine Schwangerschaft planen. Er wird Ihnen helfen zu entscheiden, ob Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> einnehmen sollten oder nicht.

Brechen Sie die Behandlung nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, denn sonst könnten mehr Anfälle auftreten. Eine Verschlechterung Ihrer Epilepsie kann auch Ihrem Baby schaden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Sie sollten kein Fahrzeug führen oder Rad fahren und keine Werkzeuge und Maschinen bedienen, bis Sie wissen, wie das Arzneimittel bei Ihnen wirkt, da *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> möglicherweise zu Schwindelgefühl und verschwommenem Sehen führen kann.

***Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 100 mg und 150 mg Filmtabletten enthalten Gelborange S (E 110).**  
Gelborange S (E 110) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

***Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 200 mg Filmtabletten enthält Ponceau 4R (E 124).**  
Ponceau 4R (E 124) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### **3. Wie ist *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### **Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup>**

- Nehmen Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> zweimal täglich ein, einmal morgens und einmal abends.
- Versuchen Sie, das Arzneimittel jeden Tag ungefähr zur gleichen Uhrzeit einzunehmen.
- Schlucken Sie die Tablette mit einem Glas Wasser.
- Sie können *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> zum Essen oder unabhängig von einer Mahlzeit einnehmen.

Üblicherweise werden Sie die Behandlung mit einer geringen Dosis beginnen, die der Arzt im Verlauf einiger Wochen langsam steigert. Wenn Sie die für sich richtige Dosis erreicht haben (die sogenannte „Erhaltungsdosis“), dann nehmen Sie täglich immer die gleiche Dosis ein. Eine Behandlung mit *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> ist eine Langzeittherapie. Nehmen Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> so lange ein, bis Ihr Arzt Ihnen sagt, dass Sie es absetzen sollen.

#### **Wie viel muss ich einnehmen?**

Unten sind die üblicherweise empfohlenen *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup>-Dosierungen für verschiedene Alters- und Gewichtsklassen aufgelistet. Wenn Sie Nieren- oder Leberprobleme haben, ist es möglich, dass der Arzt Ihnen eine andere Dosis verschreibt.

#### **Jugendliche und Kinder ab 50 kg Körpergewicht und Erwachsene**

##### Wenn Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> alleine einnehmen

Die übliche Anfangsdosis von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> beträgt zweimal täglich 50 mg.

Ihr Arzt kann Ihnen auch eine Anfangsdosis von zweimal täglich 100 mg *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> verordnen.

Ihr Arzt wird möglicherweise die Dosis, die Sie zweimal täglich einnehmen, jede Woche um 50 mg

erhöhen, bis Sie die Erhaltungsdosis von zweimal täglich 100 bis 300 mg erreicht haben.

**Wenn Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> zusammen mit anderen Antiepileptika einnehmen:**

Die übliche Anfangsdosis *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> beträgt zweimal täglich 50 mg.

Ihr Arzt wird möglicherweise die Dosis, die Sie zweimal täglich einnehmen, jede Woche um 50 mg erhöhen, bis Sie die Erhaltungsdosis von zweimal täglich 100 bis 200 mg erreicht haben.

Wenn Sie 50 kg oder mehr wiegen, kann Ihr Arzt entscheiden, die Behandlung mit *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> mit einer einzelnen Anfangsdosis von 200 mg (sogenannte „Aufsättigungsdosis“) zu beginnen. In diesem Fall würden Sie die Behandlung mit Ihrer gleichbleibenden Erhaltungsdosis 12 Stunden später beginnen.

**Kinder und Jugendliche unter 50 kg Körpergewicht**

Für diese Gewichtsklasse hängt die Dosis vom Körpergewicht ab. Die Behandlung wird üblicherweise mit einem *Lacosamid*-Sirup begonnen und nur auf die Tablettenform umgestellt, wenn die Kinder/Jugendlichen in der Lage sind, Tabletten zu schlucken, und wenn die richtige Dosis mit den unterschiedlichen Dosisstärken der Tabletten gegeben werden kann. Der Arzt wird die am besten geeignete Zubereitungsform verschreiben.

**Wenn Sie eine größere Menge von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie mehr *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> eingenommen haben, als Sie sollten, wenden Sie sich **unverzüglich** an Ihren Arzt. Versuchen Sie nicht, mit einem Fahrzeug zu fahren!

Sie können folgende Beschwerden bekommen:

- Schwindelgefühl,
- Übelkeit oder Erbrechen,
- Anfälle, Herzschlag-Probleme (z. B. zu langsamer, zu schneller oder unregelmäßiger Herzschlag), Koma oder Blutdruckabfall mit beschleunigtem Herzschlag und Schwitzen.

**Wenn Sie die Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> vergessen haben**

Wenn Sie die Einnahme bis zu 6 Stunden nach dem planmäßigen Zeitpunkt vergessen haben, holen Sie sie nach, sobald es Ihnen einfällt.

Wenn Sie die Einnahme um mehr als 6 Stunden versäumt haben, so nehmen Sie die vergessene Tablette NICHT mehr ein. Nehmen Sie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> stattdessen zum nächsten normalen Einnahmezeitpunkt wieder ein. Nehmen Sie NICHT die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> abbrechen**

Brechen Sie die Einnahme von *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> NICHT ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab, sonst können Ihre epileptischen Anfälle wieder auftreten oder sich verschlechtern.

Wenn Ihr Arzt beschließt, Ihre Behandlung mit *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> zu beenden, wird er Ihnen genau erklären, wie Sie die Dosis Schritt für Schritt verringern sollen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Das Auftreten von Nebenwirkungen, die das Nervensystem betreffen, wie z. B. Schwindel, kann nach einer einzelnen hohen Anfangsdosis (Aufsättigungsdosis) erhöht sein.

**Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn die folgenden Beschwerden auftreten:**

*Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen*

- Kopfschmerzen;
- Schwindelgefühl oder Übelkeit;
- Doppeltsehen (Diplopie).

*Häufig: kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen*

- Gleichgewichtsstörungen, Zittern (Tremor), Kribbeln (Parästhesie) oder Muskelkrämpfe, Sturzneigung und Blutergüsse;
- Gedächtnisstörungen (Vergesslichkeit), Denk- oder Wortfindungsstörungen, Verwirrtheit;
- Schnelle und nicht kontrollierbare Augenbewegungen (Nystagmus), verschwommenes Sehen;
- Drehschwindel, Gefühl der Betrunkenheit;
- Erbrechen, trockener Mund, Verstopfung, Verdauungsstörungen, übermäßige Gase im Magen oder im Darm, Durchfall;
- Vermindertes Sensitivitätsgefühl, Schwierigkeiten Wörter zu artikulieren, Aufmerksamkeitsstörungen;
- Ohrgeräusche wie Summen, Klingeln oder Pfeifen;
- Reizbarkeit, Schlafstörung, Depression;
- Schläfrigkeit, Müdigkeit oder Schwächegefühl (Asthenie);
- Juckreiz, Hautausschlag.

*Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen*

- Verlangsamter Herzschlag, spürbarer Herzschlag (Palpitationen), unregelmäßiger Puls oder andere Veränderungen in der elektrischen Aktivität des Herzens (Reizleitungsstörungen);
- Übertriebenes Wohlbefinden (euphorische Stimmung), Sehen und/oder Hören von Dingen, die nicht wirklich sind;
- Überempfindlichkeitsreaktionen gegen das Arzneimittel, Nesselausschlag;
- Auffällige Ergebnisse in Bluttests zur Leberfunktion, Leberschaden;
- Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid, Suizidversuch: Sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt!;
- Zorn und Erregtheit;
- Abnorme Gedanken oder Realitätsverlust;
- Schwere allergische Reaktion, die Schwellungen von Gesicht, Hals, Händen, Füßen, Knöcheln oder Unterschenkeln verursacht;
- Bewusstlosigkeit (Synkope);
- Schwierigkeiten bei der Bewegungskoordination oder beim Gehen.

*Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*

- Ungewöhnlich schneller Herzschlag (ventrikuläre Tachyarrhythmie);
- Halsschmerzen, Fieber und erhöhte Infektanfälligkeit. Im Blut zeigt sich möglicherweise eine erhebliche Verringerung einer bestimmten Art weißer Blutzellen (Agranulozytose);
- Schwere Hautreaktion, die mit Fieber und anderen grippeähnlichen Beschwerden einhergehen kann, Hautausschlag im Gesicht, ausgedehnter Hautausschlag, geschwollene Lymphdrüsen (vergrößerte Lymphknoten). Im Blut zeigen sich möglicherweise erhöhte Leberenzymwerte und eine erhöhte Anzahl bestimmter weißer Blutzellen (Eosinophilie);
- Ausgedehnter Ausschlag mit Blasen und abblättrender Haut, besonders um den Mund herum, an der Nase, an den Augen und im Genitalbereich (Stevens-Johnson-Syndrom), und eine schwerwiegendere Ausprägung, die eine Hautablösung an mehr als 30 % der Körperoberfläche hervorruft (toxische epidermale Nekrolyse);
- Schüttelkrämpfe (Konvulsion).

### **Zusätzliche Nebenwirkungen bei Kindern**

*Häufig: kann bis zu 1 von 10 Kindern betreffen*

- Laufende Nase (Nasopharyngitis);

- Fieber (Pyrexie);
- Rachenentzündung (Pharyngitis);
- Verminderter Appetit.

*Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Kindern betreffen*

- Schläfrigkeit oder Energielosigkeit (Lethargie).

*Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*

- Verhaltensänderungen, fremdartiges Verhalten.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton, der Blisterpackung oder dem Tablettenbehältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> enthält**

- Der Wirkstoff ist Lacosamid.

*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten  
Jede Filmtablette enthält 50 mg Lacosamid.

*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 100 mg Filmtabletten  
Jede Filmtablette enthält 100 mg Lacosamid.

*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 150 mg Filmtabletten  
Jede Filmtablette enthält 150 mg Lacosamid.

*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 200 mg Filmtabletten  
Jede Filmtablette enthält 200 mg Lacosamid.

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Hyprolöse (5.0-16.0 % m/m Hydroxypropoxy-Gruppen), Hyprolöse, hochdispertes Siliciumdioxid, Crospovidon (Typ A), Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]

Filmüberzug: Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E 171), Macrogol 3350, Talkum,  
Eisen(III)-oxid (E 172) (*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten)  
Eisen (II,III)-oxid (E 172) (*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten)  
Eisen (III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E 172) (*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 50 mg, 100 mg, 150 mg  
Filmtabletten)  
Chinolingelb (E 104) (*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 100 mg Filmtabletten)  
Gelborange-S-Aluminiumsalz (E 110) (*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 100 mg, 150 mg Filmtabletten)  
Brillantblau-FCF-Aluminiumsalz (E 133) (*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 200 mg Filmtabletten)  
Ponceau-4R-Aluminiumsalz (E 124) (*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 200 mg Filmtabletten)

### **Wie *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> aussieht und Inhalt der Packung**

#### *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten

Rosafarbene, ovale, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „50“ auf der einen und glatt auf der anderen Seite.

#### *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 100 mg Filmtabletten

Gelbe, ovale, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „100“ auf der einen und glatt auf der anderen Seite.

#### *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 150 mg Filmtabletten

Orangefarbene, ovale, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „150“ auf der einen und glatt auf der anderen Seite.

#### *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 200 mg Filmtabletten

Blaue, ovale, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „200“ auf der einen und glatt auf der anderen Seite.

*Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> ist in Blisterpackungen zu 14, 56, 98, 112, 168, 200 und 210 Filmtabletten, Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen zu 14 x 1, 56 x 1 und 60 x 1 Filmtablette und in Tablettenbehältnissen zu 60, 100 und 200 Filmtabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

ratiopharm GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm

### **Hersteller**

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company  
- TEVA Gyógyszergyár Zrt. -  
Pallagi út 13  
4042 Debrecen  
Ungarn

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

**Deutschland:** *Lacosamid-ratiopharm*<sup>®</sup> 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg Filmtabletten  
**Österreich:** *Lacosamid ratiopharm* 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg Filmtabletten  
**Spanien:** *Lacosamida ratiopharm* 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2020.**

Versionscode: Z06