

## Gebrauchsinformation

**Lectade Plus, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Eingeben für Rinder (Kälber)**

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

**Zulassungsinhaber:**

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven  
Deutschland

**Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:**

Elanco France S.A.S  
26 Rue de la Chapelle  
68330 Huningue  
Frankreich

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

**Lectade Plus, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Eingeben für Rinder (Kälber)**

**Wirkstoffe und sonstige Bestandteile**

Beutel A mit 14,7 g Pulver (Elektrolyt-Mischung)  
1 g Pulver enthält:

**Wirkstoffe**

Glycin	205,3 mg
Natriumchlorid	313,0 mg
Natriumcitrat 2 H <sub>2</sub> O	45,0 mg
Kaliumcitrat 1 H <sub>2</sub> O	220,9 mg
Kaliumdihydrogenphosphat	92,7 mg
Dinatriumhydrogencitrat 1,5 H <sub>2</sub> O	122,7 mg

**Sonstige Bestandteile**

Erythrosin (E 127)

Beutel B mit 62,7 g Pulver  
1 g Pulver enthält:

**Wirkstoff**

Glucose-Monohydrat 1000,0 mg

**Anwendungsgebiet(e)**

Lectade Plus ist zur oralen Behandlung der bei Durchfällen unterschiedlicher Genese auftretenden Störungen des Elektrolythaushaltes bestimmt.

Lectade Plus wirkt der Dehydratation, der Azidose und dem Elektrolytverlust entgegen.

Im Falle einer schweren Dehydratation mit Auftreten von Schock und Kreislaufversagen sollte die initiale Behandlung in der Verabreichung geeigneter Infusionslösungen bestehen.

**Gegenanzeigen**

Keine Angaben

**Nebenwirkungen**

Keine bekannt

Das Auftreten von Nebenwirkungen nach Anwendung von Lectade Plus sollte dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Mauerstraße 39-42, 10117 Berlin oder dem pharmazeutischen Unternehmer mitgeteilt werden.

Meldebögen können kostenlos unter o.g. Adresse oder per E-Mail (uaw@bvl.bund.de) angefordert werden.

**Zieltierart(en)**

Rind (Kalb)

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Bei den ersten Anzeichen von Durchfall sollten Milch bzw. Milchaustauscher abgesetzt werden. Hierfür erhalten die Kälber 2 mal täglich 2 Liter Lectade Plus Lösung über 2 Tage (4 Liter/Tag).

An den darauffolgenden 2 Tagen wird täglich 2 mal 1 Liter Lectade Plus-Lösung zusammen mit 1 Liter Milch bzw. Milchaustauscher gegeben. Bei Kälbern mit mehr als 50 kg KGW oder Kälbern mit stärkerem Elektrolyt- oder Wasserverlust kann die Tagesdosis auf 6 oder 8 Liter erhöht und auf 3 – 4 Einzelgaben verteilt werden.

Zum Eingeben über die Tränke. Die Lösung sollte vorzugsweise über Eimer oder Saugvorrichtungen verabreicht werden.

Dazu den Inhalt von Beutel A und von Beutel B in 2 Liter warmem Wasser auflösen. Der Inhalt der Beutel sollte stets gemeinsam verwendet werden.

Lectade Plus kann allein für maximal 4 Tage verabreicht werden.

Lectade Plus ist nur für die orale Anwendung bestimmt und kann allein oder in Verbindung mit Antibiotika eingesetzt werden.

### **Hinweise für die richtige Anwendung**

Keine Angaben

### **Wartezeit**

Kalb:

Essbare Gewebe: Null Tage

### **Besondere Lagerungshinweise**

Vor Feuchtigkeit schützen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

### **Besondere Warnhinweise**

Keine Angaben

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

### **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

02/2021

### **Weitere Angaben**

Packungsgrößen:

Beutel A mit 14,7 g Pulver (Elektrolyt-Mischung)

Beutel B mit 62,7 g Pulver (Glucose-Monohydrat)

12 Doppelbeutel im Umkarton