

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Redumed comp. Ampullen N

Homöopathisches Arzneimittel

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Redumed comp. Ampullen N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Redumed comp. Ampullen N und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Redumed comp. Ampullen N beachten?
3. Wie sind Redumed comp. Ampullen N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Redumed comp. Ampullen N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND REDUMED COMP. AMPULLEN N UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON REDUMED COMP. AMPULLEN N BEACHTEN?

Redumed comp. Ampullen N dürfen nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Redumed comp. Ampullen N sind.
- wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Redumed comp. Ampullen N ist erforderlich

Redumed comp. Ampullen N dürfen bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung von Redumed comp. Ampullen N bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Redumed comp. Ampullen N sollen deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Redumed comp. Ampullen N mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von Redumed comp. Ampullen N zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Redumed comp. Ampullen N

Redumed comp. Ampullen N enthalten Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Ampulle, d.h., sie sind nahezu „natriumfrei“.

3. WIE SIND REDUMED COMP. AMPULLEN N ANZUWENDEN?

Wenden Sie Redumed comp. Ampullen N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Soweit nicht anders verordnet, werden 3- bis 6 mal wöchentlich 1 bis 2 ml subcutan oder intramuskulär injiziert.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Redumed comp. Ampullen N zu stark oder zu schwach ist oder wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Redumed comp. Ampullen N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden (Fucus vesiculosus).

In seltenen Fällen kann es bei der Anwendung des Arzneimittels zu Juckreiz und innerer Unruhe kommen.

Hinweis:

Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND REDUMED COMP. AMPULLEN N AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ bzw. auf dem Behältnis nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Redumed comp. Ampullen N enthalten:

1 Ampulle zu 1 ml Flüssige Verdünnung enthält:

Wirkstoffe:

Adonis vernalis	Dil. D 6	0,111 ml
Calcium carbonicum Hahnemanni	Dil. D 15	0,111 ml
Capsicum annuum	Dil. D 8	0,111 ml
Fucus vesiculosus	Dil. D 6	0,111 ml
Graphites	Dil. D 15	0,111 ml
Kalium carbonicum	Dil. D 8	0,111 ml
Phytolacca americana	Dil. D 5	0,111 ml
Cascara sagrada (HAB 34) [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)]	Dil. D 3	0,111 ml
Sulfur	Dil. D 12	0,111 ml

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Die Bestandteile 1 bis 9 werden über die beiden letzten Stufen gemäß Vorschrift 40a HAB gemeinsam potenziert.

Wie Redumed comp. Ampullen N aussehen und Inhalt der Packung

Flüssige Verdünnung zur Injektion

OP mit 50 Ampullen zu 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

OP mit 100 Ampullen zu 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

AP mit 500 Ampullen zu 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

Pharmazeutischer Unternehmer

Naturamed
Arzneimittelvertriebs GmbH
Ostwall 48a
47798 Krefeld

Hersteller

Solpharm
Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH
Industriestr. 3
34212 Melsungen

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr].

Handhabung der OPC (one point-cut) Ampullen

Abbildung

Punkt nach oben! Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.

Abbildung

Punkt nach oben! Ampullenspieß nach unten abbrechen.