

NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen

100.000I.E.

Wirkstoff: Nystatin

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in der Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP beachten?
3. Wie ist NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP und wofür wird es angewendet?

1.1 Das in NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionserkrankungen mit *Candida albicans* und anderen Pilzen. Dabei wird Nystatin an die Zellmembranen gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen.

1.2 NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP wird angewendet zur Behandlung nystatinempfindlicher Pilzinfektionen der Vagina.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP beachten?

2.1 NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile von NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP sind.

2.2 Bei Anwendung von NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzen eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

2.3 Schwangerschaft und Stillzeit:

Nystatin, der Wirkstoff in NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP wird in therapeutischer Dosis nach oraler Gabe, über die intakte Haut oder über die Schleimhäute kaum resorbiert. Nystatin passiert die Plazentaschranke nicht, und ein Übertritt in die Muttermilch ist ebenfalls nicht zu erwarten.

NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

2.4 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP anzuwenden?

Wenden Sie NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Dosierung:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Führen Sie bitte 1mal täglich 1 – 2 Vaginaltabletten (100.000 – 200.000 I.E. Nystatin) tief in die Scheide ein.

3.2 Art der Anwendung:

Zum Einführen in die Scheide.

Die Vaginaltabletten sollten vor dem Schlafengehen tief in die Scheide eingeführt werden.

3.3 Dauer der Anwendung:

NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP sollte an 6 aufeinanderfolgenden Tagen angewendet werden.

Durch eine ärztliche Nachuntersuchung sollte geklärt werden, ob die Behandlung erfolgreich verlaufen oder fortzusetzen ist.

Eine gleichzeitige Behandlung des Partners mit Nystatin-haltiger Creme ist notwendig, um eine erneute Ansteckung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Anwendung hormonaler Kontrazeptiva ("Pille") die Entwicklung einer vaginalen Pilzinfektion begünstigt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP zu stark oder zu schwach ist.

- 3.4 Wenn Sie eine größere Menge NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP angewendet haben, als sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP häufiger als vorgesehen angewendet haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Anwendung so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

- 3.5 Wenn Sie zu wenig NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP angewendet oder die Anwendung einmal vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, sondern setzen Sie die Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

4.1 Nebenwirkungen

Das in NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP enthaltene Nystatin wird im Allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen setzen Sie NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP bitte ab, und sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

4.2 Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. **Wie ist NYSTATIN VAGINALTABLETTEN AP aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf den Folien, welche die Vaginaltabletten enthalten, angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen: Nicht über 25 °C lagern.

6. **Weitere Informationen**

6.1 Was Nystatin Vaginaltabletten AP enthält:

Der Wirkstoff ist Nystatin

1 Vaginaltablette enthält 100.000 I.E. Nystatin

Die sonstigen Bestandteile sind:

Cellulosepulver, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Maisstärke, Povidon (K25), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph. Eur.), Sucrose, Hochdisperses Siliciumdioxid.

6.2 Wie Nystatin Vaginaltabletten AP aussieht und Inhalt der Packung:

Aussehen: Gelbe, ovale, biplane Tablette

Originalpackung mit 12 Vaginaltabletten

6.3 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Ardeypharm GmbH

Loerfeldstr. 20

58313 Herdecke

Tel.: 02330 977 677

Stand der Information:

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Juni 2015 überarbeitet.