

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation

#### **Pflügerplex Bryonia 311 HM**

**Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: Wirkstoffe: Aconitum napellus Trit. D 4 25,0 mg, Atropa bella-donna Trit. D 4 25,0 mg, Bryonia Trit. D 5 50,0 mg, Chamomilla recutita Trit. D 3 25,0 mg, Euphrasia officinalis Trit. D 3 25,0 mg, Ferrum phosphoricum Trit. D 4 25,0 mg, Hydrargyrum bichloratum Trit. D 8 25,0 mg, Lytta vesicatoria Trit. D 4 25,0 mg, Phytolacca americana Trit. D 4 25,0 mg  
Bestandteile 1-9 über die letzte Verdünnungsstufe gemeinsam potenziert.

**Sonstige Bestandteile:** Calciumbehenat (DAB), Kartoffelstärke

100 Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel bei Entzündungen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:  
Homöopathisches Laboratorium  
A. Pflüger GmbH & Co. KG  
Röntgenstraße 4  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Die **Anwendungsgebiete** leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört:  
unterstützende Behandlung bei fieberhaft entzündlichen Erkrankungen

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, bei Fieber, das über 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

#### **Gegenanzeigen:**

Nicht anwenden bei einer Allergie gegen Kamille und andere Korbblütler.

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

#### **Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Pflügerplex Bryonia 311 HM daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen:**

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierung:** Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1 Tablette ein. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis  
(akut 2 Tabletten / chronisch 1 Tablette).

Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis  
(akut 3 Tabletten / chronisch 1-2 Tabletten).

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis  
(akut 4 Tabletten / chronisch 2 Tabletten).

In Zweifelsfällen halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

**Dauer der Anwendung:** Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:**

Nach Anwendung kann erneut Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden!

Stand: [Monat/Jahr]