

Gebrauchsinformation

Poly-Alcohol Hände-Antiseptikum

70 ml 2-Propanol/100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut

Stoff- oder Indikationsgruppe, Wirkungsweise:

Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Bakterizid (inkl. TB), fungizid und begrenzt viruzid gemäß RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004. VAH-zertifiziert.

Anwendungsgebiete:

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Gegenanzeigen:

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen 2-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Das Arzneimittel enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen. Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:

Keine bekannt.

Dosierung und Art der Anwendung:

Zur hygienischen Händedesinfektion: Unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sekunden feucht halten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion: Unverdünnt in die Hände und auf die Unterarme einreiben, diese während 1,5 Minuten feucht halten. Zur Inaktivierung von *Mycobacterium tuberculosis* ist eine zweimalige Anwendung erforderlich. Eine begrenzt viruzide Wirkung wird *in vitro* nach 30 Sekunden erzielt.

Nebenwirkungen:

Mögliche bekannte Nebenwirkungen sind: Hautirritation, Hauttrockenheit, kontaktallergische Reaktionen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren <Arzt> <oder> <,> <Apotheker> <oder das medizinische Fachpersonal>. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Dauer der Haltbarkeit:

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Zusammensetzung:

100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten:

Wirkstoff: 2-Propanol 70 ml.

Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Butan-1,3-diol.

Darreichungsform und Inhalt:

Lösung zur Anwendung auf der Haut.

100 ml, 150 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml

Pharmazeutischer Unternehmer:

Antiseptica <Dr. Hans-Joachim Molitor> <Dr. H.-J. Molitor> GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 7, 50259 Pulheim.

Hersteller:

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Str. 16, 21337 Lüneburg.

<(Gegebenenfalls Angabe des jeweiligen Mitvertreibers mit der Überschrift „Mitvertrieb:“.)>

Zur Beachtung: Alkoholhaltig, brennbar. Vor der Anwendung elektrischer Geräte Hände gut trocknen lassen.

<[Zusätzlicher Hinweis auf Packungen mit einem Volumen von ≥ 1000 ml: „Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.“]>

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: Oktober 2020

Zul.-Nr.: 2929.00.00

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

RKI gelistet (Wirkbereich A und begrenzt viruzid)

< >