

Poly-Arthrisan M

Zur Anwendung beim Menschen

Zusammensetzung:

1 Tablette (420mg) enthält die Wirkstoffe:

Colchicum autumnale Trit. D6	8,9 mg
Ferrum phosphoricum Trit. D12	29,6 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (pflanzlich), Kartoffelstärke, Cellulose

Darreichungsform und Packungsgrößen:

100 Stck. zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Poly-Arthrisan M jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen homöopathisch erfahrenen Arzt / Therapeuten aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Poly-Arthrisan M und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme / Anwendung von Poly-Arthrisan M beachten?
3. Wie ist Poly-Arthrisan M einzunehmen / anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Poly-Arthrisan M aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Poly-Arthrisan M und wofür wird es angewendet?

Stoff- und Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Gelenkbeschwerden.

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei rheumatischen Gelenkbeschwerden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme/ Anwendung von Poly-Arthrisan M beachten?

Poly-Arthrisan M Tabletten dürfen nicht eingenommen/angewendet werden während der Schwangerschaft. Wie alle Arzneimittel sollte Poly-Arthrisan M in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker eingenommen werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme/Anwendung von Poly-Arthrisan M ist erforderlich

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei andauernden Beschwerden, ist ein homöopathisch erfahrener Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Poly-Arthrisan M daher erst nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Bei Einnahme/Anwendung von Poly-Arthrisan M mit anderen Arzneimitteln:

Nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine Einschränkungen nötig.

3. Wie sind Poly-Arthrisan M einzunehmen/ anzuwenden?

Nehmen/Wenden Sie Poly-Arthrisan M immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein/an, soweit nicht anders verordnet. Bitte fragen Sie

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

bei Ihrem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je eine Tablette einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- 3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Poly-Arthrisan M zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Poly-Arthrisan M eingenommen / angewendet haben, als Sie sollten

Kehren Sie zur der verordneten Dosierung zurück. Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Wenn Sie die Einnahme / Anwendung von Poly-Arthrisan M vergessen haben

Nehmen / Wenden Sie nicht die doppelte Dosis ein / an, wenn Sie die vorherige Einnahme / Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme / Anwendung von Poly-Arthrisan M Tabletten abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Poly-Arthrisan M Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem homöopathisch erfahrenen Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker mit.

5. Wie ist Poly-Arthrisan M aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äusserer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen :

Das Behältnis fest verschlossen halten. Nicht über 25 ° C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

Das Arzneimittel kann im Abwasser entsorgt werden. Die Verpackungsmaterialien können dem Verwertungskreislauf zugeführt werden (Recycling). Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. Weitere Informationen

Was Poly-Arthrisan M Tabletten enthält:

Die Wirkstoffe sind homöopathische Verreibungen von:

Colchicum autumnale	Herbstzeitlose
Ferrum phosphoricum	Eisenphosphat

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat, Cellulose

Wie Poly-Arthrisan M aussieht und Inhalt der Packung:

Die Tabletten sind weiß.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

HANOSAN GMBH, Hanosanstr. 1, D-30826 Garbsen,
Telefon 05131-45930, Fax 05131-459345
Email: info@hanosan.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November/2012.
