

Gebrauchsinformation Information für den Anwender

POLYXAN® BLAU N comp.

Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahre

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss POLYXAN BLAU N comp. jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist POLYXAN BLAU N comp. und wofür wird es eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von POLYXAN BLAU N comp. beachten?
3. Wie ist POLYXAN BLAU N comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist POLYXAN BLAU N comp. aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist POLYXAN BLAU N comp. und wofür wird es eingenommen?

POLYXAN BLAU N comp. ist ein traditionelles homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei Erkältungen. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von POLYXAN BLAU N comp. beachten?

POLYXAN BLAU N comp. darf nicht eingenommen/angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile von POLYXAN BLAU N comp. sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme/Anwendung von POLYXAN BLAU N comp. ist erforderlich,

Zur Anwendung von POLYXAN BLAU N comp. bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. POLYXAN BLAU N comp. sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme/Anwendung von POLYXAN BLAU N comp. mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bei Einnahme/Anwendung von POLYXAN BLAU N comp. zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und der Stillzeit sollte wegen des Alkoholgehaltes POLYXAN® BLAU N comp. nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung hat POLYXAN® BLAU N comp. einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von POLYXAN BLAU N comp.:

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist POLYXAN BLAU N comp. einzunehmen?

Nehmen Sie POLYXAN BLAU N comp. immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Beschwerden 3-mal täglich 8 - 10 Tropfen vor dem Essen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 2-mal täglich 8 Tropfen vor dem Essen einnehmen.

Art und Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge POLYXAN BLAU N comp. eingenommen haben, als Sie sollten:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden etwa 12 g Alkohol aufgenommen.

Bitte sprechen sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von POLYXAN BLAU N comp. zu stark oder schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann POLYXAN BLAU N comp. Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist POLYXAN BLAU N comp. aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C lagern.

Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

6. WEITERE Informationen

10 g (= 10,8 ml) POLYXAN BLAU N comp. enthalten die Wirkstoffe:

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D6
[HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D8
[HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D10
[HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]

1,666 g Carex flava/elongata/vesicaria e rhiz. sicc. (1+1+1) Dil. D12
[HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]

Der sonstige Bestandteil ist:

Ethanol 43% (m/m)

1 ml entspricht x Tropfen

Wie POLYXAN BLAU N comp. aussieht und Inhalt der Packung:
Mischung in Flaschen zu 30 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. E. Ritsert Pharma GmbH & Co. KG

Klausenweg 12

69412 Eberbach

Tel.: 0 62 71 / 92 21-0

Fax: 0 62 71 / 92 21-55

info @ritsert.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [].