

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

#### Presselin ALL-Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane

Zur Anwendung bei Kindern über 12 Jahren und bei Erwachsenen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Presselin ALL-Tabletten jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Presselin ALL-Tabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Presselin ALL-Tabletten beachten?
3. Wie sind Presselin ALL-Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Presselin ALL-Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS SIND PRESSELIN ALL-TABLETTEEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören; Allergische Erkrankungen wie Heuschnupfen und Bronchialasthma.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Bronchialasthma sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PRESSELIN ALL-TABLETTEEN BEACHTEN?**

#### **Wann dürfen Sie Presselin ALL-Tabletten nicht anwenden?**

Presselin ALL-Tabletten dürfen nicht angewendet werden

- bei Lactoseintoleranz,
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Aralia racemosa oder andere Pflanzen der Araliaceae-Familie (z. B. Efeu) und
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Ameisensäure.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Kinder und Jugendliche**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Bei Einnahme von Presselin ALL-Tabletten mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Bei Einnahme von Presselin ALL-Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Presselin ALL-Tabletten haben keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Presselin ALL-Tabletten ist erforderlich Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Presselin ALL-Tabletten**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Presselin ALL-Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## **3. WIE SIND PRESSELIN ALL-TABLETTEN EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### **Soweit nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene:**

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Presselin ALL-Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungs- oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

### **Wenn Sie die Einnahme von Presselin ALL-Tabletten vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Nehmen Sie die folgende Dosis zum nächsten Zeitpunkt ein, an dem Sie diese normalerweise einnehmen

würden. Fahren Sie mit der Dosierung so fort, wie verordnet oder in dieser Packungsbeilage beschrieben.

**Wenn Sie die Einnahme von Presselin ALL-Tabletten abbrechen:**

Sollten bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten über die weitere Behandlung.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können auch Presselin ALL-Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE SIND PRESSELIN ALL-TABLETTEN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

**Was Presselin ALL-Tabletten enthalten:**

**Zusammensetzung:**

1 Tablette enthält als arzneilich wirksame Bestandteile:

Acidum arsenicosum D6 trit.	80 mg
Acidum formicum D3 trit.	5 mg
Aralia racemosa D2 trit.	5 mg
Cuprum aceticum D4 trit.	80 mg
Lobelia inflata D4 trit.	80 mg

Gemeinsam potenziert über die letzte Stufe.

Sonstige Bestandteile:

Magnesiumstearat, Maisstärke.

**Inhalt der Packung:**

Presselin ALL-Tabletten ist in Packungen mit 30 (Musterpackung), 100 und 200 Tabletten erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

PharmaSGP GmbH

Am Haag 14

82166 Gräfelfing

Tel.: 089 / 85 89 639-150

Fax: 089 / 85 89 639-201

E-Mail: [info@pharmasgp.com](mailto:info@pharmasgp.com)

**Hersteller**

Spreewälder Arzneimittel GmbH

Schulstraße 9

15913 Märkische Heide

[www.spreewaelder-arzneimittel.de](http://www.spreewaelder-arzneimittel.de)

[info@spreewaelder-arzneimittel.de](mailto:info@spreewaelder-arzneimittel.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2021.**