

Anlage

Propolis Halspastillen
Zul.-Nr. 6224931.00.00
Börner GmbH

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Propolis Halspastillen

30 mg

Lutschpastille

Wirkstoff: Propolis (gepulvert) (*Note: kann entfallen*)

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Propolis Halspastillen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Propolis Halspastillen und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Propolis Halspastillen beachten?
3. Wie ist Propolis Halspastillen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Propolis Halspastillen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. **WAS IST PROPOLIS HALSPASTILLEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**
Propolis Halspastillen ist ein pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiet:

Zur unterstützenden Behandlung bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenbereich.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ROPOLIS HALSPASTILLEN BEACHTEN?**

Propolis Halspastillen darf nicht eingenommen werden

- Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Propolis oder einem sonstigen Bestandteil der Propolis Halspastillen sollten Sie das Arzneimittel nicht anwenden. Das gilt auch, wenn Sie auf Zimt oder Perubalsam überempfindlich reagieren (Kreuzallergie) oder unter einer Bienenstichallergie leiden.

- Propolis Halspastillen enthält Menthol. Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie unter Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, leiden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Propolis Halspastillen ist erforderlich, Kinder

- Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, soll Propolis Halspastillen bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Propolis Halspastillen mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Inkompatibilitäten sind nicht bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Sie können Propolis Halspastillen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch in der Schwangerschaft nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen.

Stillzeit

Sie können Propolis Halspastillen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch in der Stillzeit nach Rücksprache mit ihrem Arzt einnehmen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

- Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Propolis Halspastillen:

Dieses Arzneimittel enthält Isomalt. Bitte nehmen Sie Propolis Halspastillen daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. WIE IST PROPOLIS HALSPASTILLEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Propolis Halspastillen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre bei Erkältungsanzeichen alle 2-3 Stunden eine Propolis Halspastille langsam im Mund zergehen.

Art der Anwendung

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum (Zergehenlassen im Mund)

Dauer der Anwendung

Das Medikament soll ohne ärztlichen Rat nicht längerfristig eingenommen werden.

Die maximale Dosis beträgt 6 Lutschpastillen täglich.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Propolis Halspastillen zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Propolis Halspastillen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen

Häufig: kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen

Selten: kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen

Sehr selten: kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Propolis kann nach der Anwendung auf der Haut sowie auf der Schleimhaut des Mund-, Hals- und Rachenraumes Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Die Häufigkeit, mit der diese Nebenwirkungen auftreten, ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST PROPOLIS HALSPASTILLEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Propolis Halspastillen enthält:

Der Wirkstoff ist:

1 Lutschpastille enthält 30 mg Propolis (gepulvert)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Isomalt, Levomenthol, Pfefferminzöl, Gereinigtes Wasser, Hochdisperses Siliciumdioxid, Saccharin-Natrium

1 Lutschpastille enthält Kohlenhydrate, entsprechend ca. 0,12 BE

Wie Propolis Halspastillen aussieht und Inhalt der Packung:

Propolis Halspastillen ist in Packungen mit 10 bzw. 30 Lutschpastillen erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Hersteller/ Vertrieb:

roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

bzw.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Hersteller:

roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Vertrieb:

Zirkulin Naturheilmittel GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 90
28355 Bremen

bzw:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremern

Vertrieb:

Districon GmbH
Am Joseph 15
61273 Wehrheim

bzw:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Börner GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremern

Hersteller und Vertrieb:

Districon GmbH
Standort Bielefeld
Heidsieker Heide 114
33739 Bielefeld