

Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. **Was ist Prostagutt® uno urtica und wofür wird es angewendet?**
2. **Was sollten Sie vor der Einnahme von Prostagutt® uno urtica beachten?**
3. **Wie ist Prostagutt® uno urtica einzunehmen?**
4. **Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
5. **Wie ist Prostagutt® uno urtica aufzubewahren?**
6. **Inhalt der Packung und weitere Informationen**

Prostagutt® uno urtica

460 mg / Filmtablette

Für männliche Erwachsene

Wirkstoff: Brennnesselwurzeltrockenextrakt

1. Was ist Prostagutt® uno urtica und wofür wird es angewendet?

Prostagutt® uno urtica ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Besserung von Prostata-bedingten Harnbeschwerden.

Prostagutt® uno urtica wird angewendet bei:

Prostagutt® uno urtica wird von Männern angewendet gegen Beschwerden beim Wasserlassen bei einer gutartigen Vergrößerung der Vorsteherdrüse (Prostata) im Stadium I bis II nach Alken bzw. II bis III nach Vahlensieck.

Eine Behandlung mit Prostagutt® uno urtica sollte nur nach ärztlicher Diagnose mit Ausschluss ernster Erkrankungen im Bereich der Harnwege erfolgen. Dieses Arzneimittel behebt nicht die Vergrößerung.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Prostagutt® uno urtica beachten?

Prostagutt® uno urtica darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Brennnesselwurzel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Prostagutt® uno urtica einnehmen.

Bei Verschlimmerung der Beschwerden, bei Blut im Urin, Schmerzen beim Wasserlassen, oder akuter Harnverhaltung sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

Vor der Behandlung mit Prostagutt® uno urtica sollte eine ärztliche Untersuchung einschließlich Krebs-Vorsorge durchgeführt werden.

Einnahme von Prostagutt® uno urtica zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden,

kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Untersuchungen mit Prostagutt® uno urtica zu möglichen Wechselwirkungen mit anderen gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln liegen jedoch nicht vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Prostagutt® uno urtica enthält Lactose

Dieses Arzneimittel enthält Milchzucker (Lactose). Bitte nehmen Sie Prostagutt® uno urtica daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Prostagutt® uno urtica enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Filmtablette, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Prostagutt® uno urtica einzunehmen?

Nehmen Sie diese Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Nehmen Sie einmal täglich 1 Filmtablette Prostagutt® uno urtica ein.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Die Anwendung von Prostagutt® uno urtica ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht vorgesehen.

Personen, die an einer Nieren- oder Lebererkrankung leiden:

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nierenfunktion / Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Art der Anwendung

Prostagutt® uno urtica sollte möglichst zur gleichen Tageszeit mit ausreichend Flüssigkeit nach einer Mahlzeit eingenommen werden.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Behandlung entscheidet der behandelnde Arzt. Diese richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Gegen eine längerfristige Anwendung von Prostagutt® uno urtica bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Bei Auftreten unklarer und länger anhaltender Beschwerden sollte jedoch der behandelnde Arzt befragt werden. Bitte beachten Sie die Angaben unter Anwendungsgebiete und Vorsichtsmaßnahmen.

Wenn Sie eine größere Menge von Prostagutt® uno urtica eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung von Prostagutt® uno urtica können die im Abschnitt 4. „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“ genannten Magen-Darm-Beschwerden verstärkt auftreten. Prostagutt® uno urtica sollte dann abgesetzt werden und es sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie die Einnahme von Prostagutt® uno urtica vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben, sondern fahren Sie mit der nächsten Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist, oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen (Häufigkeit nicht bekannt)

- Magen-, Darmbeschwerden wie Übelkeit, Sodbrennen, Völlegefühl, Durchfall und Blähungen
- Überempfindlichkeitsreaktionen wie Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Prostagutt® uno urtica nicht nochmals eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Prostagutt® uno urtica aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Prostagutt® uno urtica enthält:

Der Wirkstoff ist: Brennnesselwurzel-trockenextrakt

1 Filmtablette enthält:

460 mg Trockenextrakt aus Brennnesselwurzel (7-14:1)

Auszugsmittel: Methanol 20 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Cellulosepulver, Hochdisperses Siliciumdioxid, Lactose-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, Poly(O-carboxylmethyl)stärke, Natriumsalz, Stearinsäure, Talkum, Basisches Polymethacrylat (Eudragit E100), Titandioxid (E171)

Hinweis für Diabetiker

1 Filmtablette enthält 0,006 Broteinheiten (BE).

Wie Prostagutt® uno urtica aussieht und Inhalt der Packung:

Prostagutt® uno urtica sind weiße, runde Filmtabletten in Blister verpackt.

Prostagutt® uno urtica ist erhältlich in Originalpackung mit 30, 60 und 120 Filmtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

76227 Karlsruhe

Telefon: 0721/4005-0

Telefax: 0721/4005-500

www.schwabe.de

Hersteller:

C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG
Frühlingstraße 7
D-83620 Feldkirchen-Westerham

[oder]

Biokanol Pharma GmbH
Kehler Str. 7
D-76437 Rastatt

[oder]

Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlanstr. 1
D-29439 Luechow

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2020.