

Angaben gemäß § 11 AMG (Packungsbeilage)

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Regasinum antallergicum

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Regasinum antallergicum jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Regasinum antallergicum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der s. c. Injektion von Regasinum antallergicum beachten?
3. Wie ist Regasinum antallergicum anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Regasinum antallergicum aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST REGASINUM ANTALLERGICUM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Regasinum antallergicum ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

Allergische Erkrankungen der Atemorgane wie Heuschnupfen und Asthma.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER S. C. INJEKTION VON REGASINUM ANTALLERGICUM BEACHTEN?

Regasinum antallergicum darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Bienengift oder einen der Wirkstoffe Apis mellifica, Aralia racemosa, Naja tripudians, Acidum formicicum sind (siehe Punkt 6 "Weitere Informationen").

Besondere Vorsicht bei der Einnahme/Anwendung von /.../ ist erforderlich:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Bei Anwendung von Regasinum antallergicum mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur unter Aufsicht des Arztes angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es gibt keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung dieser Funktionen durch Regasinum antallergicum.

3. WIE IST REGASINUM ANTALLERGICUM ANZUWENDEN?

Wenden Sie Regasinum antallergicum immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen parenteral 1 - 2 Ampullen täglich s. c. injizieren.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1 - 2 Ampullen täglich s. c. injizieren.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Regasinum antallergicum angewendet haben als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Regasinum antallergicum angewendet haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Anwendung von Regasinum antallergicum vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung von Regasinum antallergicum vergessen haben. Wenden Sie es an, sobald Sie sich daran erinnern. Fahren Sie dann mit der nächsten Dosis zur üblichen Zeit fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Regasinum antallergicum Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Bei subkutanen Injektionen kann es zu Rötungen an der Einstichstelle kommen.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST REGASINUM ANTALLERGICUM AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Regasinum antallergicum soll nicht über 25 °C gelagert werden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Regasinum antallergicum enthält:

Die Wirkstoffe in einer Ampulle sind:

Apis mellifica Dil. D4	0,54 ml
Aralia racemosa Dil. D3	0,13 ml
Naja tripudians Dil. D8	0,13 ml
Acidum formicicum Dil. D6	0,20 ml

Gemeinsam potenziert über die letzten zwei Stufen nach Vorschrift 40a HAB.

Wie Regasinum antallergicum aussieht und Inhalt der Packung

Regasinum antallergicum ist eine flüssige Verdünnung zur Injektion.

Originalpackungen: 6 Ampullen zu 1 ml
 60 Ampullen zu 1 ml

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

ROWA WAGNER GmbH & Co. KG

Arzneimittelfabrik

Frankenforster Strasse 77

D-51427 Bergisch Gladbach

Telefon: +49-2204-61081

Telefax: +49-2204-61084

E-Mail: info@rowakg.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im: []