
Gebrauchsinformation

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Roter Ginseng von Gintec Kapseln

300 mg rotes Ginsengwurzelpulver, Hartkapsel

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Wirkstoff: Rotes Ginsengwurzel-Pulver

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Roter Ginseng von Gintec Kapseln und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln beachten?
3. Wie ist Roter Ginseng von Gintec Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Roter Ginseng von Gintec Kapseln aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Gebrauchsinformation

1. Was ist Roter Ginseng von Gintec Kapseln und wofür wird es angewendet?

Roter Ginseng von Gintec Kapseln ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Erschöpfungszuständen wie Müdigkeit und Schwäche.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln beachten?

Roter Ginseng von Gintec Kapseln darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Ginseng oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf qualifizierte Person konsultieren.

Beachten Sie bitte auch die ergänzenden Angaben im Abschnitt „Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht durchgeführt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol wurden nicht durchgeführt.

Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol sind bisher nicht bekannt geworden.

Gebrauchsinformation

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dieses Arzneimittel sollte in der Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.

Untersuchungen zur Beeinflussung von Zeugungs-/Gebärfähigkeit liegen nicht vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Untersuchungen über die Auswirkungen der Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen liegen nicht vor.

3. Wie ist Roter Ginseng von Gintec Kapseln einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zum Einnehmen.

Erwachsene nehmen 1-mal täglich 4 Kapseln.

Hartkapseln nicht im Liegen einnehmen.

Nehmen Sie die Kapseln bitte vor dem Frühstück unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Dauer der Anwendung

Roter Ginseng von Gintec Kapseln darf nicht länger als 3 Monate eingenommen werden. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder länger als zwei Wochen andauern, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Beachten Sie bitte auch die ergänzenden Angaben im Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.

Gebrauchsinformation

Wenn Sie eine größere Menge von Roter Ginseng von Gintec Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 4 oder 8 Kapseln) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können die als Nebenwirkungen bekannten Symptome Magenschmerzen, Übelkeit und Durchfall verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Roter Ginseng von Gintec Kapseln abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Im Zweifelsfalle befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach der Einnahme von Zubereitungen aus rotem Ginseng-Wurzelpulver können Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Juckreiz), Schlafstörungen und Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung) auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. Bei Auftreten von Nebenwirkungen informieren Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: <http://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Gebrauchsinformation

5. Wie ist Roter Ginseng von Gintec Kapseln aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Nicht über 25°C aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Durchdrückpackung nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Roter Ginseng von Gintec Kapseln enthält

- Der Wirkstoff ist: Rotes Ginsengwurzel-Pulver.
1 Hartkapsel enthält 300 mg Pulver aus roten, in frischem Zustand mit heißem Wasserdampf behandelten Ginsengwurzeln.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Gelatine, Natriumdodecylsulfat, gereinigtes Wasser.

Wie Roter Ginseng von Gintec Kapseln aussieht und Inhalt der Packung

Roter Ginseng von Gintec Kapseln sind transparent und enthalten ein hellbraunes bis beigefarbenes Pulver. Sie sind in Packungen mit 30, 100, 110 oder 120 Hartkapseln erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Registrierungsinhaber:

Gintec Europe GmbH
Wilhelmstr. 21
D-68623 Lampertheim
Tel: +49(0)6206-9694950
Fax: +49(0)6206-9694958
E-Mail: info@gintec.de

Hersteller

Klocke Pharma-Service GmbH
Straßburger Strasse 77
D-77767 Appenweier

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet in 06.2019.