

Gebrauchsinformation

Information für Anwender

Sarsaparol® Uro

Wirkstoff: Sarsaparilla Ø

Darreichungsform: Urtinktur

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Sarsaparol® Uro und wofür wird es eingenommen?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Sarsaparol® Uro beachten?
3. Wie ist Sarsaparol® Uro einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sarsaparol® Uro aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Sarsaparol® Uro und wofür wird es eingenommen?

Sarsaparol® Uro ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnorgane.

Sarsaparol® Uro wird angewendet bei:

Das Anwendungsgebiet entspricht dem homöopathischen Arzneimittelbild.

Dazu gehören:

Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen und Reizungen der Harnorgane.

Hinweis:

Bei Blut im Urin, bei Fieber und/oder anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Sarsaparol® Uro beachten?

Sarsaparol® Uro darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Sarsaparilla (Stechwinde) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Säuglingen nicht angewendet werden.

Sarsaparol® Uro ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Sarsaparol® Uro einnehmen.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Sarsaparol® Uro bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Kinder

Zur Anwendung bei Kindern keine Angaben. Es soll deshalb vom 2. - 6. Lebensjahr nicht angewendet werden.

Einnahme anderer Arzneimittel

Informieren Sie Ihren Arzt über alle eingenommenen/angewendeten Arzneimittel.

Sarsaparol® Uro kann die Wirkung anderer Arzneimittel verstärken (z. B. Diuretika).

Einnahme Nahrungsmittel

Die Wirkung von Sarsaparol® Uro wird durch allgemeine Ernährung und durch Rauchen nicht beeinflusst. Falls Sie sich bei der Einnahme von Sarsaparol® Uro Sorgen machen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Schwangerschaft

Wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden möchten, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker vor der Einnahme von Sarsaparol® Uro.

Da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes soll Sarsaparol® Uro in Schwangerschaft nicht angewendet werden. Bitte sprechen Sie mit dem Arzt.

Verkehrsmittel und Maschinen

Es sind keine besonderen Vorkehrungen erforderlich.

Sarsaparol® Uro enthält Alkohol

Sarsaparol® Uro enthält 67 Vol. -% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,3 g Alkohol zugeführt.

3. Wie ist Sarsaparol® Uro einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene Jugendliche über 12 Jahre:

1-3 mal täglich 5 Tropfen.

Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr:

1-3 mal täglich 2-3 Tropfen

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr:

1-3 mal täglich 3-4 Tropfen.

Dauer der Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels bei akuten Zuständen sollte nicht länger als einige Tage (max. 1 Woche) erfolgen.

Bei länger dauernden Erkrankungen sollte die Anwendungsdauer in Absprache mit Ihrem Therapeuten erfolgen.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Sarsaparol® Uro zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Sarsaparol® Uro eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann zu Magenreizung mit Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Schwitzen und erhöhter Harnausscheidung, sowie zu vorübergehenden Nierenschäden führen. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und ihren Arzt befragen.

Insbesondere bei Kleinkindern kann die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden etwa 27 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie die Einnahme von Sarsaparol® Uro vergessen haben

Falls Sie einmal eine Anwendung vergessen haben, so fahren Sie bitte mit der Anwendung in der verordneten Dosierung fort. Keinesfalls sollten Sie eine vergessene Anwendung durch die Anwendung einer doppelten Menge nachholen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sofern bei der Einnahme von Sarsaparol® Uro Hautreaktionen auftreten, ist nach einer Einnahmepause und ärztlicher Rücksprache auf einen höheren Verdünnungsgrad ab Sarsaparilla D 4 überzugehen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. Wie ist Sarsaparol® Uro aufzubewahren?

Vor Gebrauch kurz schütteln!

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Das Verfalls- und dem Etikett Verwenden Datum!

Arzneimittel

6. Inhalt der Packung

Was Sarsaparol® Uro

Der Wirkstoff

10 ml Sarsaparol® Uro

Wie Sarsaparol® Uro

Sarsaparol® Uro

50 ml Urtinktur

Pharmazeutisches

MIT Gesundheits

47533 Kleve

Produktgruppe

Sabona Natur

Flutstraße 74

47533 Kleve

Tel.: 0 28 21-7

Fax: 0 28 21-7

Email: info@

Diese Gebrauchsinformation

[]