Gebrauchsinformation
Information für den Anwender

Eurimisk, überzogene Tabletten

Wirkstoffe: Passionsblumenkraut-Pulver
Baldrianwurzel-Trockenextrakt
Hopfenzapfen-Trockenextrakt

Zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahren und Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Gebrauchsinformation steht:

1. Was ist Eurimisk und wofür wird es eingenommen?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Eurimisk beachten?
3. Wie ist Eurimisk einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eurimisk aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Eurimisk und wofür wird es eingenommen?

Eurimisk ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung.

Eurimisk wird angewendet bei:
Unruhezuständen und nervös bedingten Einschlafstörungen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Eurimisk beachten?

Eurimisk darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. Genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtmaßnahmen
Falls die Beschwerden länger als 2 Wochen andauern oder sich verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Kinder
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher wird die Einnahme von Eurimisk für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen.

Bei Einnahme von Eurimisk mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bei Einnahme von Eurimisk zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Trinken Sie während der Anwendung von Eurimisk möglichst keinen Alkohol.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aus der verbreiteten Anwendung von Baldrianwurzel, Passionsblumenkraut und Hopfenzapfen als Arzneimittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ergeben. Es liegen jedoch keine Ergebnisse experimenteller Untersuchungen vor. Sie sollten dieses Arzneimittel deshalb in der

Schwang
Verkeh
Sie sollt
keine K
ohne sic
bei best
gilt in ve

Eurimis
Das Arz
einer U
sollten
einnehm

3. Wie

Nehmen
brauchsi
oder Ap
Arzt ode

Die emp
Erwachs

- zur B
3 über
- zur E
3 über
hen.

Art der
Die über
(z.B. 1 G

Bitte neh

Dauer d
Die Anw
grenzt. E
Vorsicht

Bitte spr
Eindruck
schwach

Wenn Sie eine größere Menge Eurimisk eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal eine doppelte oder dreifache der vorgesehenen Dosierung (entspricht 6 – 9 überzogenen Tabletten) eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie Eurimisk erheblich überdosiert haben, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Eurimisk vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Eurimisk abbrechen

Bitte brechen Sie die Behandlung mit Eurimisk nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab. Ihre Krankheit könnte sich hierdurch verschlechtern.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten können allergische Hautreaktionen auftreten.

Wenn Sie von einer genannten Nebenwirkungen betroffen sind, nehmen Sie Eurimisk nicht weiter ein und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

In der Regel genügt ein Absetzen von Eurimisk, um die Nebenwirkungen wieder verschwinden zu lassen. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf dieses Arzneimittel nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Eurimisk aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25°C lagern!

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Eurimisk enthält:

Die Wirkstoffe sind Passionsblumenkraut-Pulver, Baldrianwurzel-Trockenextrakt, Hopfenzapfen-Trockenextrakt.

1 überzogene Tablette enthält:

Passionsblumenkraut-Pulver	200,00	mg
Trockenextrakt aus Baldrianwurzeln (4-5:1)	56,25	mg
Auszugsmittel: Methanol 45% (m/m),		
Trockenextrakt aus Hopfenzapfen (5,5-6,5:1)	13,50	mg
Auszugsmittel: Wasser		

Die sonstigen Bestandteile sind:

Povidon, Maltodextrin, Siliciumdioxid-Hydrat, Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz, Calciumstearat (Ph.Eur.), Schellack, Glycerol-mono/diacetatdi/monoalkanoat (C18), Talkum, Cal-

ciumcarb
oxid (E1

Wie Eu

Eurimisl
Eurimisl
50 über
100 über

Pharmaz

MIT Ges
47533 K

Produktg
Sabona
Flutstr. 7
47533 K
Tel.: 0 2
Fax: 0 2
Email: in

Diese Ge