

Wortlaut für das Etikett (Multi-Wrap-Etikett) gemäß § 10 und § 11 AMG

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Spenglersan® Kolloid Dx Mischung zur Anwendung bei Erwachsenen

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sowie die Informationen auf der Innenseite dieses Etiketts sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Spenglersan Kolloid Dx** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Spenglersan Kolloid Dx und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid Dx beachten ?
3. Wie ist Spenglersan Kolloid Dx anzuwenden ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist Spenglersan Kolloid Dx aufzubewahren ?
6. Weitere Informationen

1 WAS IST SPENGLERSAN Kolloid Dx UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET ?

- 1.1 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei einer Selbstbehandlung sollte darauf geachtet werden, dass bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden sollte. Es könnte sich um Erkrankungen handeln, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2 WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SPENGLERSAN KOLLOID DX BEACHTEN ?

- 2.1 **Spenglersan Kolloid Dx darf nicht angewendet werden**, wenn Sie überempfindlich sind gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder den sonstigen Bestandteilen. Bei Patienten mit hochgradigen Rhythmusstörungen oder

Stenokardien und während der Schwangerschaft sollte Spenglersan Kolloid Dx nicht angewendet werden.

Spenglersan Kolloid Dx nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

- 2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spenglersan Kolloid Dx ist erforderlich in der Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte Spenglersan Kolloid Dx in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich bei der Anwendung des Arzneimittels bei älteren Menschen und für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

2.3 **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:**

Damit Spenglersan Kolloid Dx wirken kann, sollten Sie mindestens 12 Stunden vor der Einreibung keine schmerzstillenden oder beruhigenden Medikamente anwenden. Metallgegenstände an Händen und Armen sollten während der Anwendung abgelegt werden.

Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

3 WIE IST SPENGLERSAN KOLLOID Dx ANZUWENDEN ?

Wenden Sie Spenglersan Kolloid Dx immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

- 3.1 Die **Dosierung sollte nur nach Rücksprache** mit einem Arzt oder einem homöopathischen Therapeuten festgelegt werden.

- 3.2 Art der Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren: Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße in die Ellenbeuge und reiben Sie das Arzneimittel mit dem Daumenballen in die Haut ein. Es ist möglich, die verordnete Menge portionsweise aufzusprühen und einzureiben.

Hinweis: Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Therapeuten, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Spenglersan Kolloid Dx zu stark oder zu schwach ist.

- 3.3 **Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan Kolloid Dx angewendet** haben als Sie sollten, **ist nicht mit Intoxikationen** zu rechnen.

- 3.4 Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan Kolloid Dx vergessen haben, holen Sie diese Anwendung einfach nach.

- 3.5 Wenn Sie die Anwendung mit Spenglersan Kolloid Dx abbrechen, können sich die vorhandenen Beschwerden erneut verschlimmern. In diesem Fall sollten Sie unverzüglich ihren Arzt bzw. Therapeuten befragen.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen beobachten.

5 Wie ist Spenglersan Kolloid Dx aufzubewahren ?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25°C aufbewahren.

6 Weitere Angaben

Was Spenglersan Kolloid Dx in 10 g enthält:

Die Wirkstoffe sind:

Antigene aus Staphylococcus aureus subsp. aureus Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,67 g
Antitoxine aus Staphylococcus aureus subsp. aureus Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58b)	1,67 g
Antigene aus Streptococcus pneumoniae subsp. pneumonia Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	3,33 g
Antitoxine aus Streptococcus pneumoniae subsp. pneumonia Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58b)	3,33 g

gemeinsam potenziert über 8 Stufen.

Sonstige Bestandteile: Thymol, Salzsäure 25 % (m/V)

1 Sprühstoß entspricht 1 Tropfen

Spenglersan Kolloid Dx ist eine Mischung zur Anwendung auf der Haut und in Sprühflaschen mit 10 ml, 20 ml, 50 ml und 100 ml erhältlich.

Auf der Packung mit 10 ml zusätzlich: „Unverkäufliches Muster“.

Anwendung auf der Haut

Reg.-Nr.: 2522595.00.00

Ch.-B.: [...]

Haltbarkeit nach Anbruch: [...]

Verwendbar bis: [Monat/Jahr]

Hersteller:

Meckel-Spenglersan GmbH · Steinfeldweg 13 · 77815 Bühl · Tel: (07223) 3 06 71 ·

Fax: (07223) 87 13 · E-Post: info@spenglersan.de · <http://www.spenglersan.de>

Diese Information wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr].

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel der *MECKEL-SPENGLERSAN GmbH* erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen homöopathischen Arzneibuches (HAB) Deutschlands und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) produziert worden. Sie können sich deshalb auf eine gleich bleibende Qualität unserer Arzneimittel verlassen.

Wir wünschen Ihnen baldige Besserung und Wohlbefinden.

Ihre MECKEL-SPENGLERSAN GmbH