

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Spenglersan® Kolloid K Mischung zur Anwendung bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sowie die Informationen auf der Innenseite dieses Etiketts sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Spenglersan Kolloid K** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 6 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Spenglersan Kolloid K und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid K beachten ?
3. Wie ist Spenglersan Kolloid K anzuwenden ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist Spenglersan Kolloid K aufzubewahren ?
6. Weitere Angaben

1 WAS IST SPENGLERSAN K UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET ?

- 1.1 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei einer Selbstbehandlung sollte darauf geachtet werden, dass bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden sollte. Es könnte sich um Erkrankungen handeln, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2 WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SPENGLERSAN KOLLOID K BEACHTEN ?

- 2.1 **Spenglersan Kolloid K darf nicht angewendet werden**, wenn Sie überempfindlich sind gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder den sonstigen Bestandteilen.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spenglersan Kolloid K **ist erforderlich** in der Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Spenglersan Kolloid K in

Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich bei der Anwendung des Arzneimittels bei älteren Menschen, bei Kindern und Säuglingen und für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

3 WIE IST SPENGLERSAN KOLLOID K ANZUWENDEN ?

Wenden Sie Spenglersan Kolloid K immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

- 3.1 Erwachsene und Kinder ab dem 12. Lebensjahr: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Sprühstöße in die Ellenbeuge einreiben. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
- 3.2 Art der Anwendung bei Erwachsenen: Anwendung auf der Haut. Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße in die Ellenbeuge und reiben Sie das Arzneimittel mit dem Daumenballen in die Haut ein. Es ist möglich, die verordnete Menge portionsweise aufzusprühen und einzureiben. Art der Anwendung bei Kindern und Säuglingen: Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße auf die Bauchhaut des Kindes und reiben Sie das Arzneimittel mit dem Unterarm des Kindes ein.

Hinweis: Bei Anwendung mehrerer Spenglersan Kolloide sollen diese in einem Abstand von mindestens 2 Stunden oder im täglichen Wechsel angewendet werden. Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Therapeuten, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Spenglersan Kolloid K zu stark oder zu schwach ist.

- 3.3 Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan Kolloid K angewendet haben als Sie sollten, ist nicht mit Intoxikationen zu rechnen.
- 3.4 Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan Kolloid K vergessen haben, holen Sie diese Anwendung nicht nach, sondern fahren Sie mit der nächsten Einreibung fort.
- 3.5 Wenn Sie die Anwendung von Spengleran Kolloid K abbrechen, können sich die vorhandenen Beschwerden erneut verschlimmern. In diesem Fall sollten Sie unverzüglich ihren Arzt bzw. Therapeuten befragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nach der Anwendung von [Spenglersan Kolloid K](#) kann es zu Hautrötungen an der Einreibestelle kommen. Angaben zur Häufigkeit liegen nicht vor.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen beobachten.

5 Wie ist Spenglersan Kolloid K aufzubewahren ?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25°C aufbewahren

6 Weitere Angaben

Was Spenglersan Kolloid K in 10 g enthält:

Die Wirkstoffe sind:

Antigene aus <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	1,67 g
Antitoxine aus <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58b)	1,67 g
Antigene aus <i>Streptococcus pneumoniae</i> subsp. <i>pneumonia</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58a)	3,33 g
Antitoxine aus <i>Streptococcus pneumoniae</i> subsp. <i>pneumonia</i> Spengler ad usum externum Dil. D9 (HAB, Vorschrift 58b)	3,33 g

gemeinsam potenziert über 8 Stufen.

Sonstige Bestandteile: Thymol, Salzsäure 25 % (m/V)

1 Sprühstoß entspricht 1 Tropfen

Spenglersan Kolloid K ist eine Mischung zur Anwendung auf der Haut und in Sprühflaschen mit 10 ml, 20 ml, 50 ml und 100 ml erhältlich.

Auf der Packung mit 10 ml zusätzlich: „Unverkäufliches Muster“.

Anwendung auf der Haut.

Reg.-Nr.: 2522597.00.00

Ch.-B.: [...]

Haltbarkeit nach Anbruch [...]

Verwendbar bis: [Monat/Jahr]

Hersteller:

Meckel-Spenglersan GmbH · Steinfeldweg 13 · 77815 Bühl · Tel: (07223) 3 06 71 ·
Fax: (07223) 87 13 · E-Post: info@spenglersan.de · <http://www.spenglersan.de>

Diese Information wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr].

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel der *MECKEL-SPENGLERSAN GmbH* erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches (HAB) Deutschlands und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) produziert worden. Sie können sich deshalb auf eine gleich bleibende Qualität unserer Arzneimittel verlassen.

Wir wünschen Ihnen baldige Besserung und Wohlbefinden.

Ihre MECKEL-SPENGLERSAN GmbH