

Gebrauchsinformation

Spirol®, Levomenthol 0,79 g, Pfefferminzöl 0,33 g, Ethanol 46,0 g / 100 g, Lösung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage / Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Spirol jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie ihren Apotheker, wenn sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Spirol und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spirol beachten?
3. Wie ist Spirol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spirol aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Spirol und wofür wird es angewendet?

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Spirol ist ein traditionelles Arzneimittel

Anwendungsgebiete

Spirol wird traditionell angewendet zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen wie z. B. Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spirol beachten?

Spirol darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Levomenthol, Pfefferminzöl oder einem der sonstigen Bestandteile von Spirol sind,

- auf geschädigter Haut, z.B. bei Verbrennungen, Ekzemen und offenen Wunden oder bei Haut- und Kinderkrankheiten mit Exanthem, sowie auf der Schleimhaut und am Auge.

Kinder

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Spirol soll deshalb bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aus Sicherheitsgründen ist Spirol nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anzuwenden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spirol ist erforderlich

Dieses Arzneimittel enthält 58,3 Vol.-% Alkohol.

Nicht im Bereich der Augen auftragen, der Kontakt von Spirol mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden sollte vermieden werden.

Nach dem Auftragen von Spirol sollten die Hände gründlich gereinigt werden.

Anwendung von Spirol mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Spirol

Achtung! Spirol enthält einen hohen Anteil (58,3 Vol.-%) Alkohol.

3. Wie ist Spirol anzuwenden?

Wenden Sie Spirol immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Art der Anwendung

Anwendung auf der intakten Haut.

Bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahre soll Spirol 1 bis 3mal täglich angewendet werden. Die betroffenen Hautstellen mit Spirol einreiben und massieren, für Umschläge Spirol unverdünnt anwenden.

Die Anwendung des Präparates sollte nicht unter abschließenden Verbänden und nicht gleichzeitig mit Wärmeanwendung erfolgen.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt, beachten Sie jedoch bitte die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Spirol Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei allen auftreten müssen.

An der Haut können verstärkte Reizerscheinungen auftreten. Das Auftreten von Kontaktekzemen und / oder Überempfindlichkeitsreaktionen ist möglich.

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Levomenthol und Pfefferminzöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

In diesen Fällen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Spirol aufzubewahren?

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25°C aufbewahren!

6. Weitere Informationen

Was Spirol enthält:

100 g Lösung enthalten:

Wirkstoffe:

Levomenthol 0,79 g

Pfefferminzöl 0,33 g

Ethanol 46,00 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Vanillin, Citronenöl, Citronellöl, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser.

Wie Spirol aussieht und Inhalt der Packung:

Spirol ist eine klare farblose Flüssigkeit und in einer Braunglasflasche abgefüllt.

Die Abpackungsgrößen sind: 50 ml, 100 ml und 200 ml

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b

06406 Bernburg

Tel.: 03471 / 8600

Fax: 03471 / 860408

Die Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2013

Eigenschaften:

Spirol ist ein wertvolles und seit vielen Jahren bewährtes Hausmittel.

Es enthält ätherische Öle, die auf Grund ihrer fettfreundlichen Eigenschaften gut durch die Haut vom Körper aufgenommen werden und dabei leicht hautreizend und durchblutungsfördernd wirken.