

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Die Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Stibium metallicum praeparatum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Stibium metallicum praeparatum beachten?
3. Wie ist Stibium metallicum praeparatum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

**Stibium metallicum praeparatum  
Verreibungen**

**1. Was ist Stibium metallicum praeparatum und wofür wird es angewendet?**

Stibium metallicum praeparatum ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane; bei Hauterkrankungen und bei Erkrankungen der Atmungsorgane.

**Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Anregung der Formprozesse im Aufbaustoffwechsel, z.B. bei geschwürig-entzündlichen Veränderungen im Magen-Darm-Trakt und an der Haut sowie bei Blutungen. Allergische und katarrhalische Zustände der oberen Luftwege, als Zusatzbehandlung bei Bronchialasthma, Herzrhythmusstörungen; Störungen von Antrieb und Gedächtnis; Verstimmungen.

**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Stibium metallicum praeparatum beachten?**

**Gegenanzeigen**

Keine bekannt

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

**Kinder**

Bei Säuglingen im 1. Lebensjahr sollen Stibium metallicum praeparatum Verreibungen nicht angewendet werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Stibium metallicum praeparatum**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **3. Wie ist Stibium metallicum praeparatum einzunehmen?**

Nehmen Sie Stibium metallicum praeparatum immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

*Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene:*

Einzeldosis: D4: 1 Dosierlöffel Pulver; D6 – D30: 1 Messerspitze Pulver.

Häufigkeit der Einnahme: Verreibungen D4, D6: 1 – 3 mal täglich;  
Verreibung D10: 1 – 2 mal täglich;  
Verreibungen D20, D30: 1 mal täglich.

Lassen Sie die Verreibung im Mund zergehen oder nehmen Sie sie mit etwas Flüssigkeit ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Verreibungen sollen ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4 Wochen angewendet werden.

*Wenn Sie die Einnahme von Stibium metallicum praeparatum vergessen haben:*

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch der Packung ist die Verreibung 6 Monate haltbar.

#### **Zusammensetzung**

Arzneimittelbezeichnung	10 g enthalten: Wirkstoff:
Stibium metallicum praeparatum D4	Stibium metallicum praeparatum Trit. D4 10 g
Stibium metallicum praeparatum D6	Stibium metallicum praeparatum Trit. D6 10 g
Stibium metallicum praeparatum D10	Stibium metallicum praeparatum Trit. D10 10 g
Stibium metallicum praeparatum D20	Stibium metallicum praeparatum Trit. D20 10 g
Stibium metallicum praeparatum D30	Stibium metallicum praeparatum Trit. D30 10 g

#### **Darreichungsform und Packungsgröße**

20 g Verreibung

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** März 2018