

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Sulfur jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich das Krankheitsbild verschlimmert oder die Beschwerden länger anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Sulfur und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sulfur beachten?
3. Wie ist Sulfur einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

**Sulfur
Verreibungen**

1. Was ist Sulfur und wofür wird es angewendet?

Sulfur ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Anregung der Verdauungs- und Stoffwechselprozesse sowie der Ausscheidung der Abbauprodukte, bei chronischen und wiederholt auftretenden Entzündungen von Haut, Gelenken und inneren Organen sowie bei allgemeiner Reaktionsschwäche; venöse Stauungen, auch im Pfortadergebiet. Missempfindungen an Haut und Schleimhäuten, auch im Zusammenhang mit Schlafstörungen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sulfur beachten?

Gegenanzeigen

Sulfur D3, D4 und D6 darf in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei starker Entzündung oder Eiterungen der Haut, Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken, plötzlicher Gewichtszunahme sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt und bei allen anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Bei plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen in den Beinen bei venöser Stauung, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Kinder

Sulfur sollte bei Kindern unter 18 Jahren bei chronischen und wiederholt auftretenden Entzündungen von Gelenken und inneren Organen und venösen Stauungen, auch im Pfortadergebiet sowie bei Missempfindungen an Haut und Schleimhäuten nur nach ärztlicher Verordnung angewendet werden.

Bei Säuglingen im 1. Lebensjahr sollten Sulfur Verreibungen nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Bei Kleinkindern von 1 bis 5 Jahren sollten Sulfur Verreibungen erst ab der Potenzstufe D6 angewendet werden, bei Kindern von 6 bis 11 Jahren ab der Potenzstufe D4.

Schwangerschaft und Stillzeit

Siehe unter Gegenanzeigen.

Wie alle Arzneimittel sollte Sulfur in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Sulfur

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Sulfur einzunehmen?

Nehmen Sie Sulfur immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

D3	Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren	1–3 mal täglich 1 Messerspitze Pulver
D4	Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren	1–3 mal täglich 1 Messerspitze Pulver
D6	Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr	1–3 mal täglich 1 Messerspitze Pulver
D12	Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr	1–2 mal täglich 1 Messerspitze Pulver
D20, D30	Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr	1 mal täglich 1 Messerspitze Pulver

Lassen Sie die Verreibung im Mund zergehen oder nehmen Sie sie mit etwas Flüssigkeit ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern siehe auch unter „2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sulfur beachten?“ Abschnitt „Kinder“.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 – 5 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Sulfur vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Sulfur Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Entzündungen können sich aufgrund einer überschießenden Reaktion zu Beginn der Behandlung

etwas verstärken. Über die Fortführung der Behandlung sprechen Sie in diesem Fall bitte mit Ihrem Arzt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C lagern.

Zusammensetzung

Arzneimittelbezeichnung	10 g enthalten: Wirkstoff:	
Sulfur D3	Sulfur Trit. D3	10 g
Sulfur D4	Sulfur Trit. D4	10 g
Sulfur D6	Sulfur Trit. D6	10 g
Sulfur D12	Sulfur Trit. D12	10 g
Sulfur D20	Sulfur Trit. D20	10 g
Sulfur D30	Sulfur Trit. D30	10 g

Darreichungsform und Packungsgröße

20 g Verreibung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: August 2016

Von den aufgeführten Potenzstufen sind möglicherweise nicht alle im Handel erhältlich.