

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex®

Homöopathisches Arzneimittel
Mischung zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® beachten?
3. Wie ist Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST TIRO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen bitte medizinischen Rat einholen.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON TIRO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® BEACHTEN?

Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® darf nicht angewendet werden:

- Wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6 genannten Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Chininüberempfindlichkeit sowie
- bei Alkoholkranken.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® ist erforderlich:

Kinder:

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® mit anderen Arzneimitteln:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Anwendung von Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® enthält Alkohol:

Enthält 52,8 Vol.% Alkohol.

3. WIE IST TIRO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

1-3 mal täglich 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung hängt von Art und Umfang der Beschwerden ab.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie die Einnahme von Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® vergessen haben:

Holen Sie diese bitte nach, sobald Sie es bemerken. Nehmen Sie aber nicht die doppelte Dosis ein.

Wenn Sie eine größere Menge von Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® eingenommen haben, als Sie sollten:

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST TIRO-CYL® L HO-LEN-COMPLEX® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**Was Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

10 g (entsprechend 10,7 ml) Mischung enthalten:

Arsenicum album Dil. D6	1,50 g
Arsenum jodatum Dil. D8	1,50 g
Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12	1,50 g
Chininum arsenicosum Dil. D6	1,50 g
Lachesis Dil. D12	1,50 g
Lycopus virginicus Dil. D3	1,25 g
Pulsatilla Dil. D6	1,25 g

1 g entspricht 23 Tropfen

Wie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® aussieht und Inhalt der Packung:

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung / unverkäufliches Muster mit 30ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharma Liebermann GmbH

Hauptstr. 27

D-89423 Gundelfingen/Donau

Tel.: 09073-958930

Fax: 09073-9589355

E-Mail: info@pharma-liebermann.de

Reg.-Nr 2522451.00.00

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr]