

## Beschriftungsentwurf für die Gebrauchsinformation

Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels:

**Urophyton liquidum**, Tropfen zum Einnehmen

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Wirkstoff: Queckenwurzelstock-Fluidextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses traditionelle pflanzliche Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Urophyton liquidum** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **Urophyton liquidum** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Urophyton liquidum** beachten?
3. Wie ist **Urophyton liquidum** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Urophyton liquidum** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. Was ist Urophyton liquidum und wofür wird es angewendet?

**Urophyton liquidum** wird traditionell angewendet zur Durchspülung und unterstützenden Behandlung leichter Beschwerden der ableitenden Harnwege.

Hinweis: **Urophyton liquidum** ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist und der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten andere als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

## 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Urophyton liquidum beachten?

### 2.1 Urophyton liquidum darf nicht eingenommen werden bei

- Überempfindlichkeit gegenüber Queckenwurzelstock
- Erkrankungen der Niere sowie bei eingeschränkter Nierenfunktion
- Ödemen infolge eingeschränkter Herz- oder Nierenfunktion
- Alkoholerkrankung

### 2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Urophyton liquidum ist erforderlich:

Wegen des Alkoholgehaltes darf **Urophyton liquidum** von Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Sollte bei Ihnen eines oder mehrere der folgenden Symptome auftreten, ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen:

- Blut im Urin
- Beschwerden beim Wasserlassen
- Akuter Harnverhalt

### **Kinder**

Kindern unter 18 Jahren sollte das Arzneimittel nicht verabreicht werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel von dieser Patientengruppe nicht angewendet werden.

## **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich

## **Wichtige Warnhinweise zu bestimmten sonstigen Bestandteilen von Urophyton liquidum**

Dieses Arzneimittel enthält 16,5 Vol. % Ethanol (Alkohol).

### **2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Durch den enthaltenen Alkohol kann die Wirkung anderer Arzneimittel beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich nicht um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **2.4 Bei Einnahme von Urophyton liquidum zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

sind keine Besonderheiten zu beachten.

## **3. Wie ist Urophyton liquidum einzunehmen?**

Nehmen Sie **Urophyton liquidum** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### **3.1 Art der Anwendung**

Tropfen zum Einnehmen.

### **3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

für Erwachsene ab 18 Jahre

3 x täglich einen Messbecher mit je 3 ml

Nehmen Sie die **Urophyton liquidum** ½ Stunde vor dem Essen ein.

Nehmen Sie die Tropfen bitte in einem Glas warmen Wassers ein und trinken Sie ausreichend Flüssigkeit nach (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Urophyton liquidum** zu stark oder zu schwach ist.

Tropfen zum Einnehmen.

### **3.3 Wie lange sollten Sie Urophyton liquidum anwenden?**

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt.

Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Bitte beachten Sie auch die Angaben unter „Vorsichtsmaßnahmen“ (siehe Punkt 2.1 bis 2.4 dieser Packungsbeilage)

### **3.4 Wenn Sie eine größere Menge von Urophyton liquidum eingenommen haben, als Sie sollten:**

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend 1 bis 2 Messbecher zu je 3 ml) mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in dieser Packungsbeilage beschrieben.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden 13.37 g Alkohol (Flascheninhalt 100 ml) aufgenommen. Pro Einzeldosis beträgt die aufgenommene Alkoholmenge 0.40 g.

### **3.5 Wenn Sie die Einnahme von Urophyton liquidum vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern fahren Sie mit der Einnahme wie von Ihrem Arzt verordnet oder in dieser Packungsbeilage beschrieben fort.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken und nehmen Sie so lange **Urophyton liquidum** nicht mehr ein.

## **5. Wie ist Urophyton liquidum aufzubewahren?**

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht über 25°C lagern.
- In der Originalverpackung aufbewahren.
- Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verwenden.

## **6. Weitere Informationen**

Was **Urophyton liquidum** enthält:

### **100 ml der Tropfen enthalten:**

100 ml Fluidextrakt aus Queckenwurzelstock (1:1)

Auszugsmittel: Ethanol 20 % (V/V)

Es sind keine weiteren Bestandteile enthalten.

Wie **Urophyton liquidum** aussieht und Inhalt der Packung:

**Urophyton liquidum** ist in der Originalpackung mit 100 ml (N1) erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Zeppenfeldt Pharma GmbH

Weiler Strasse 19 – 21

79515 Lörrach

Telefon: 07621/919290

Telefax: 07621/9192930

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr]