

Prospecto: información para el usuario

AERO-RED FORTE 240 mg cápsulas blandas Simeticona

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días.

Contenido del prospecto:

1. Qué es AERO-RED FORTE 240 mg y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar AERO-RED FORTE 240 mg
3. Cómo tomar AERO-RED FORTE 240 mg
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de AERO-RED FORTE 240 mg
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Aero-red Forte 240 mg y para qué se utiliza

La simeticona es el principio activo de este medicamento y actúa destruyendo las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasiona.

Está indicado para el alivio sintomático de los gases en adultos

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Aero-red Forte 240 mg

No tome AERO-RED FORTE 240 mg

- Si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 10 días de tratamiento, o si tiene estreñimiento que no mejora, debe consultar al médico.

Toma de AERO-RED FORTE 240 mg con otros medicamentos

La toma de este medicamento no afecta a la eficacia de otros medicamentos.

Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Toma de AERO-RED FORTE 240 mg con alimentos, bebidas y alcohol

La toma de este medicamento con alimentos y bebidas no afecta a la eficacia del mismo.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Aunque el principio activo de este medicamento no se absorbe, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben tomar este medicamento sin consultarlo con su médico.

Conducción y uso de máquinas

AERO-RED FORTE 240 no tiene efectos conocidos sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

3. Cómo tomar Aero-red Forte 240 mg

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 1 cápsula después de cada comida principal (comida y cena)

Este medicamento se toma por vía oral.

Trague la cápsula con un vaso grande de agua.

No tome el medicamento durante más de 10 días seguidos.

Si los síntomas empeoran o no mejoran en 10 días seguidos de tratamiento, debe suspenderlo y consultar al médico.

Si toma más AERO-RED FORTE 240 mg del que debe

No se conocen casos de sobredosificación.

Aún en el caso de que se ingiera una cantidad muy superior a la indicada, es muy poco probable que se produzcan efectos adversos, debido a la falta de absorción digestiva del fármaco.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame el Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20 (Indicando el medicamento y la cantidad ingerida)

Si olvidó tomar AERO-RED FORTE 240 mg

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

En caso necesario tome 1 cápsula después de la siguiente comida principal.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos AERO-RED FORTE 240 mg puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de la simeticona se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no ha podido establecerse:

- estreñimiento transitorio moderado y náuseas
- pueden producirse eructos que constituyen el mecanismo normal de eliminación de los gases con este tratamiento
- reacciones alérgicas (de hipersensibilidad) tales como erupción y picor en la piel, edema en la cara o en la lengua o dificultad para respirar.

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del sistema Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>.


Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Aero-red Forte 240 mg

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y blister después de CAD.. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido de Aero-red Forte 240 mg

Composición de AERO-RED FORTE 240 mg

El principio activo es simeticona. Cada cápsula contiene 240 mg de simeticona.

Los demás componentes (excipientes) son gelatina y glicerol (E-422)

Aspecto del producto y contenido del envase

AERO-RED 240 mg son cápsulas blandas de gelatina transparente.

Cada envase contiene 20 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización

Uriach Consumer Healthcare, S.L
Av. Camí Reial 51-57
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona - España)

Responsable de la fabricación

Laboratorios Alcala Farma, S.L.
Avenida de Madrid, 82
28802 Alcalá de Henares
(Madrid – España)

Fecha de la última revisión de este prospecto: Junio 2013

Consejos de Educación Sanitaria

Problemas digestivos:

Indigestión:

Se puede producir si usted:

Come demasiado

Come comidas ricas en grasas

Come demasiado rápido, sin masticar

Bebe demasiado alcohol con las comidas

Trate de evitar estos desencadenantes

Gases (flatulencia):

Con algunas comidas es más probable la aparición de gases porque:

Contienen aire por sí mismas (por ejemplo bebidas gaseosas, pan fresco)

Contienen altos niveles de carbohidratos los cuales no se absorben (por ejemplo, verduras secas, repollo, verduras crudas, cebollas)

Trate de evitar estas comidas

Consulte a su médico o farmacéutico si necesita más información

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>