

## Prospecto: información para el paciente

### Bactroban 20 mg/g pomada

mupirocina

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### Contenido del prospecto:

1. Qué es Bactroban pomada y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Bactroban pomada
3. Cómo usar Bactroban pomada
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Bactroban pomada
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Bactroban pomada y para qué se utiliza

Bactroban pomada contiene mupirocina, un antibiótico, que actúa eliminando las bacterias que causan infecciones.

**Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.**

**Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.**

**No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.**

Se utiliza para tratar infecciones superficiales de la piel siempre que su extensión sea limitada.

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Bactroban pomada

##### No use Bactroban pomada:

- Si es alérgico a la mupirocina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
- No utilice por vía intranasal u oftálmica
- No utilice con cánulas ni cerca de catéteres intravenosos

##### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Bactroban pomada.

Bactroban pomada puede causar **irritación de la piel y reacciones alérgicas. Ver sección 4.**

- ➔ **Mantener la pomada lejos de los ojos.** Si la pomada entra accidentalmente en contacto con los ojos, **lavarlos abundantemente con agua.**

Bactroban pomada contiene un componente (excipiente) llamado polietilenglicol, que al aplicarlo sobre la piel dañada puede ser absorbido por el organismo, sobre todo en el caso de lesiones extensas o heridas abiertas, empeorando la función renal.

### **Uso de Bactroban pomada con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento. Esto incluye los medicamentos adquiridos sin receta.

No debe usar este medicamento simultáneamente con otros productos destinados al tratamiento de la misma zona de aplicación.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

La información sobre la seguridad de este medicamento en mujeres embarazadas es limitada.

No se debe administrar Bactroban pomada a mujeres embarazadas a no ser que los beneficios compensen los potenciales riesgos del tratamiento.

Se desconoce si mupirocina puede pasar a la leche materna. Si está dando el pecho, debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento.

Si finalmente se utilizara este medicamento para tratar las grietas en el pezón, debe lavarse bien el pecho para eliminar restos del producto antes de realizar la lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

Este medicamento no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

## **3. Cómo usar Bactroban pomada**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Uso cutáneo. Exclusivamente para uso externo.

#### *Adultos y niños*

Aplicar la pomada 2 - 3 veces al día, hasta un máximo de 10 días. Su médico evaluará el tratamiento a los 5 días de tratamiento para ver su evolución.

#### *Pacientes con insuficiencia renal*

Su médico valorará el uso de este medicamento en el caso de que exista el riesgo de absorción de polietilenglicol cuando se aplica sobre piel dañada.

#### *Pacientes de edad avanzada*

No es necesario efectuar un ajuste posológico a menos que exista evidencia de insuficiencia renal moderada o grave.

**Modo de empleo:**

- Antes de la aplicación **lávese las manos** y la zona a tratar.
- Con la ayuda de un algodón o una torunda, aplique **una pequeña cantidad** de pomada sobre toda la zona afectada.
- Tras la aplicación de la pomada, puede cubrir la zona tratada con un vendaje o gasa, a menos que su médico le diga que deje la zona sin cubrir.

Si tras cinco días de tratamiento no nota mejoría acuda a su médico.

**Si usa más Bactroban pomada del que debe**

Si ha aplicado más pomada de lo que debe, retire el exceso cuidadosamente.

Si accidentalmente ingiere este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

**Si olvidó usar Bactroban pomada**

Si olvida administrar una dosis, aplique la siguiente lo antes posible y continúe la administración como hasta ese momento.

No administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

No suspenda el tratamiento antes de lo indicado por su médico aunque se encuentre mejor. Si lo hiciese la infección podría reaparecer.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

**Situaciones que necesita vigilar:****Reacciones alérgicas graves**

Estas reacciones se producen muy raramente en personas que están usando Bactroban pomada. Los signos incluyen:

- erupción cutánea que produce picor
- hinchazón, algunas veces de la cara o la boca, lo que provoca dificultad para respirar
- colapso o pérdida del conocimiento.

➔ Si tiene cualquiera de estos síntomas, **contacte inmediatamente con su médico**. Deje de utilizar Bactroban pomada.

Bactroban pomada puede causar **irritación en la piel**.

➔ Si tiene irritación en la piel, **deje de utilizar Bactroban pomada**. **Retire los restos del medicamento y consulte con su médico lo antes posible**.

En raras ocasiones, los medicamentos como Bactroban pomada (por contener un antibiótico), pueden causar inflamación del colon (intestino grueso), causando diarrea, generalmente con sangre y mucosidad, dolor de estómago, fiebre (*colitis pseudomembranosa*).

➔ Si tiene alguno de estos síntomas, **consulte con su médico tan pronto como le sea posible.**

#### **Efectos adversos frecuentes**

Pueden afectar hasta a 1 de cada 10 personas:

- sensación de ardor en el lugar de aplicación.

#### **Efectos adversos poco frecuentes**

Pueden afectar hasta a 1 de cada 100 personas:

- picor, enrojecimiento, escozor y/o sequedad localizados en el área de aplicación.

#### **Efectos adversos muy raros**

Pueden afectar hasta a 1 de cada 10.000 personas:

- reacciones alérgicas.

#### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

[www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Bactroban pomada**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.


Conservar por debajo de 25 °C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y el tubo. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Una vez abierto, el periodo de validez de este medicamento es de 10 días.

No utilice este medicamento si observa que la pomada no tiene un color blanco o casi blanco.

Desechar el producto sobrante.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

#### **Composición de Bactroban pomada**

- El principio activo es mupirocina. Cada gramo de pomada contiene 20 mg de mupirocina.
- Los demás componentes son polietilenglicol 400 y polietilenglicol 3350.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Bactroban se presenta en un tubo de aluminio con boquilla y tapón, que contiene 15 o 30 gramos de pomada.

### **Titular de la autorización de comercialización**

GlaxoSmithKline, S.A.  
P.T.M.C/Severo Ochoa, 2  
28760 Tres Cantos  
Madrid  
Tlf. 900 20 27 00  
es-ci@gsk.com

### **Responsable de la fabricación**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
12 Riverwalk  
Citywest Business Campus  
Dublín 24  
Irlanda

o

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna  
ul. Grunwaldzka 189  
60-322 Poznań  
Polonia

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** marzo 2020.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>