

Prospecto: información para el usuario

**Callívoros Marthand® Apósito impregnado**  
Ácido salicílico/ Benzocaína

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 6 días.

**Contenido del prospecto**

1. Qué es Callívoros Marthand y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Callívoros Marthand
3. Cómo usar Callívoros Marthand
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Callívoros Marthand
6. Contenido del envase e información adicional

**1. Qué es Callívoros Marthand y para qué se utiliza**

Es un medicamento que contiene un queratolítico (ácido salicílico) que facilita el desprendimiento de los callos y un anestésico local (benzocaína).

Está indicado para la eliminación de durezas, callos y ojos de gallo en adultos (bajo control médico en menores de 18 años).

**2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Callívoros Marthand**

**No use Callívoros Marthand**

- Si es alérgico (hipersensible) al ácido salicílico, a la benzocaína o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
- Si es diabético o tiene problemas de circulación periférica.
- Si la zona que rodea al callo está herida, inflamada, enrojecida o irritada.

**Advertencias y precauciones**

Se recomienda no usar conjuntamente con otros productos queratolíticos en la misma zona.

Se debe evitar el contacto con los ojos, la cara, los genitales y las mucosas.

**Niños y adolescentes**

El uso de este medicamento por los menores de 18 años solo se hará bajo control médico.

### **Uso de Callívoro Marthand con otros medicamentos**

No usar conjuntamente con otros productos en la misma zona.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

El uso de este medicamento no tiene efecto sobre la conducción o uso de máquinas.

**Callívoro Marthand** contiene caucho natural (látex).

Puede producir reacciones alérgicas graves porque contiene látex procedente del caucho natural.

## **3. Cómo usar Callívoro Marthand**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

### Aplicación en adultos mayores de 18 años:

1. Extraer el apósito del sobre.
2. Cortar un trozo de apósito del tamaño del callo o dureza a tratar y desprender el papel siliconado protector.
3. Aplicar el trozo cortado sobre la parte afectada, limpia y seca, recubriéndolo todo con esparadrapo.
4. Dejar actuar hasta que el callo pueda extraerse sin dolor con ayuda de un baño de agua caliente (de 2 a 3 días).
5. Si el callo o la dureza ofrece resistencia a ser extraído sin dolor, repetir el tratamiento cambiando el apósito por uno nuevo.

Si a los 6 días no se ha eliminado o los síntomas empeoran, consulte a su médico o farmacéutico.

### **Uso en niños y adolescentes**

Los menores de 18 años solo utilizarán este producto bajo control médico.

### **Si usa más Callívoro Marthand del que debe**

Dada la forma farmacéutica, es improbable la ocurrencia de sobredosis.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Callívoro Marthand puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.


Puede producirse un enrojecimiento e irritación de las zonas circundantes al callo o dureza.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

## **5. Conservación de Callívoro Marthand**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice Callívoro Marthand después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y en el sobre después de “CAD” . La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Callívoro Marthand**

Por cm<sup>2</sup>:

- Los principios activos son ácido salicílico (34,28 mg) y benzocaína (2,86 mg).
- Los demás componentes (excipientes) son: caucho natural (látex), colofonia y tela soporte.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Apósito flexible que contiene caucho natural (látex), de 7 cm x 4 cm. Consta de una película (de color marrón/ de consistencia semisólida/ con ligera adhesividad) que recubre un soporte de tela color blanco-beige. La cara adhesiva, de color marrón, va protegida con papel siliconado.

Envase conteniendo 1 sobre con 1 apósito (de 7 cm x 4 cm) de uso cutáneo.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

MARTÍNEZ LLENAS, S.A.

Afuera de Santa Inés s/n

08430 - La Roca del Vallés (Barcelona) España.

### **Fecha de la última revisión de este prospecto: Marzo 2012.**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.